

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА


Уважаемый пациент,

Внимательно прочитайте инструкцию перед приемом препарата.

Сохраните инструкцию, возможно, Вам потребуется перечитать ее снова.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

**Климадион®**



**Растительное лекарственное средство для облегчения симптомов менопаузы**

### Лекарственная форма

Раствор для приема внутрь

### Состав

50 г раствора Климадион® содержит:

6 г жидкого экстракта корневища цимицифуги (*Cimicifugae racemosae*) (1:5), что соответствует 1,2 г высушенного лекарственного растительного сырья; экстрагирующее вещество 50 % этиловый спирт

*Вспомогательные ингредиенты:* сахарин натрий, мяты перечной масло, этиловый спирт 96%, вода очищенная

Содержание этанола 38% в объёмном соотношении.

### Описание

Прозрачная или слегка мутная жидкость светло-коричневого цвета с запахом древесины. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

### Производитель:

БИОНОРИКА СЕ  
Кершенштайнерштрассе 11-15,  
92318 Ноймаркт  
Телефон: +49 (0) 9181 231-90  
Факс: +49 (0) 9181 231-265  
Интернет: [www.bionorica.de](http://www.bionorica.de)

Представительство в Республике Беларусь  
220095 г. Минск, пр. Рокоссовского 64, пом.2 Н  
тел/факс (+375 17) 342-40-08, 271-40-13  
e-mail [office@bionorica.by](mailto:office@bionorica.by)

### Фармакотерапевтическая группа


Код АТС: G02CX04. Другие гинекологические препараты. Цимицифуги корневища.

### Показания к применению

Растительное лекарственное средство для облегчения симптомов менопаузы, таких как приливы и повышенная потливость.

## Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства



НД РБ

## Предостережения и меры предосторожности

Следует принимать Климадинон® раствор с осторожностью

8621 - 2017

- пациенткам, имеющим в анамнезе заболевания печени, не следует принимать Климадинон® без предварительной консультации врача
- если у пациента развиваются признаки и симптомы, указывающие на поражение печени (усталость, потеря аппетита, пожелтение кожи и глаз, сильные боли в верхней части живота, тошнота, рвота или темная моча), следует прекратить приём Климадинона® раствор и немедленно обратиться к врачу
- при появлении нарушений цикла или повторных менструаций, а так же новых и неясных симптомов следует обратиться к врачу, так как это может свидетельствовать о заболевании, требующем медицинского вмешательства.
- пациенткам репродуктивного возраста на время приема следует позаботиться о контрацепции
- не следует принимать вместе с эстрогенами, если это не назначено врачом
- пациентам, которые прошли или проходят лечение (курс лечения) против рака молочной железы или других гормонозависимых опухолей, не следует принимать Климадинон® раствор без консультации у врача
- если наблюдается ухудшение симптоматики во время приема препарата, необходимо проконсультироваться с врачом
- лекарственное средство содержит 38 % этанола (в/в), то есть до 0,28 г этанола на 30 капель, что соответствует 7 мл пива или 3 мл вина. Этанол может повредить людям, страдающим от алкоголизма. Также это должно быть принято во внимание при приеме в период беременности или кормления грудью, при применении у детей, и у пациентов из групп высокого риска, например, с заболеваниями печени или эпилепсией.

*Примечание для больных сахарным диабетом:*

Разовая доза препарата не содержит «хлебных единиц» (ХЕ).

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не известны

## Применение в период беременности и кормления грудью

Исследования данного лекарственного средства в период беременности и кормления грудью не проводились. Из-за отсутствия соответствующих исследований не рекомендуется применение препарата в период беременности и лактации.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министрства здравоохранения  
Республики Беларусь

## Влияние на способность управлять автомобилем или механизмами

Отсутствуют исследования о влиянии на способность управлять автомобилем или механизмами.

НД РБ

## Способ применения и дозы

8621 - 2017

Принимается внутрь. Взрослым по 30 капель 2 раза в день в одно и то же время суток (утром и вечером).

При использовании держать флакон вертикально. Перед употреблением взбалтывать!

Принимать раствор неразведенным или на кусочке сахара.

Терапевтический эффект наступает постепенно и проявляется приблизительно через 2 недели лечения.

Не следует принимать Климадинон® дольше 6 месяцев без консультации врача.

Если симптомы сохраняются на протяжении курса лечения, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

## Побочное действие

Прием препаратов, содержащих цимицифугу, может сопровождаться печеночной токсичностью (включая гепатит, желтуху, изменение печеночных функциональных тестов). Частота не известна.

Возможно возникновение кожных реакций (например, крапивница, зуд, экзантема), отек лица, периферические отёки, а также нарушение работы желудочно-кишечного тракта (например, диспепсические расстройства, диарея). Частота не известна.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

## Передозировка

Случаи передозировки препарата описаны не были. В случае употребления препарата в дозах, превышающих терапевтические, необходимо проводить симптоматическое лечение.

## Условия хранения и срок годности

Срок годности указан на упаковке. Открытый флакон можно использовать в течение 3 месяцев. Не применять после окончания срока годности! Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

## Форма выпуска

Флаконы темного стекла с дозирующим устройством по 50 мл вместе с инструкцией по медицинскому применению помещаются в складную картонную коробку.

## Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача