


5855 - 2017

ВАЛИДОЛ-ЛУБНЫФАРМ  
таблетки по 60 мг



## ЛИСТОК – ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

*Прочитайте внимательно этот листок-вкладыш прежде чем начать применение препарата!  
Сохраняйте этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его снова.  
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.*

*Этот препарат предназначен лично Вам, не следует передавать его другим лицам.  
Это может причинить вред их здоровью, даже если симптомы их заболевания схожи с теми, что наблюдаются у Вас.*

### **Состав лекарственного средства:**

*действующее вещество:* 1 таблетка содержит раствора ментола в ментиловом эфире кислоты изовалериановой - 60 мг;

*вспомогательные вещества:* сахар-песок рафинированный, кальция стеарат.

**Лекарственная форма.** Таблетки.

Цельные, правильные, круглые цилиндры, верхняя и нижняя поверхность которых плоская, края поверхностей скошенные, с риской для деления, белого или белого с желтоватым оттенком цвета, характерного запаха ментола и охлаждающего вкуса. На поверхности таблетки допускаются серые вкрапления и незначительная опыленность белого цвета.

**Международное непатентованное название:** отсутствует.

**Фармакотерапевтическая группа:** прочие комбинации лекарственных средств для лечения заболеваний сердца.

**Код АТС:** C01EX.

### **Фармакологические свойства.**

#### **Фармакодинамика.**

Оказывает седативное действие, обладает умеренным рефлекторным сосудорасширяющим действием, обусловленным раздражением чувствительных нервных окончаний.

#### **Фармакокинетика.**

При сублингвальном применении абсорбируется со слизистой оболочки полости рта. После всасывания биотрансформируется в печени и выделяется с мочой в виде глюкуронидов.

### **Показания к применению.**


Применяют в комплексной терапии при неврастении и функциональной кардиалгии. Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

### **Противопоказания.**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- выраженная артериальная гипотензия;
- острый инфаркт миокарда;
- детский возраст до 18 лет;
- пациентам с эпилепсией и судорожным синдромом в анамнезе (включая фебрильные судороги).

**С осторожностью:** желудочно-пищеводный рефлюкс, грыжа пищеводного отверстия

диафрагмы, воспалительные и язвенные заболевания бронхиальная астма, склонность к бронхоспазму и ларингоспазму.



### **Меры предосторожности.**

Если во время приема лекарственного средства симптомы ухудшение состояния необходимо обратиться к врачу.

В случае, если боль в области сердца не проходит после приема лекарственного средства, необходимо исключать острый коронарный синдром. Необходима немедленная медицинская помощь при возникновении боли в области сердца с иррадиацией в руку, верхнюю часть живота, шею, или в случае развития дыхательной недостаточности (например, одышка).

Лекарственное средство содержит сахар. Пациентам с непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует принимать этот препарат.

Одна таблетка содержит 1,158 г сахара, что необходимо учитывать пациентам с сахарным диабетом.

### **Особые предостережения.**

#### ***Применение во время беременности или кормления грудью.***

Применение во время беременности и кормления грудью не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

#### ***Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.***

При приеме препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

**Дети.** Применение у детей в возрасте до 18 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

### **Способ применения и дозы.**

Препарат назначают взрослым по 1 таблетке под язык до ее полного рассасывания. Принимают по 1 таблетке 2-3 раза в сутки. Кратность и продолжительность приема определяется в зависимости от эффективности лечения. При отсутствии или недостаточной выраженности терапевтического эффекта в ближайшие 5-10 минут после приема препарата необходимо обратиться к врачу для назначения другой терапии.

### **Передозировка.**

В случае передозировки возможны головная боль, тошнота, диарея, образование ректальных язв, желудочно-кишечные расстройства, снижение артериального давления, дыхательные расстройства, нарушения ритма сердца, атаксия, возбуждение, эпилептические судороги, потеря сознания и другие нарушения со стороны центральной нервной системы.

В случае передозировки необходимо отменить препарат. Лечение симптоматическое.

### **Побочные эффекты.**

Возможно развитие аллергических реакций (сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек), тошноты, изжоги, слезотечения, головокружения, сонливости, снижения артериального давления.

Контактная аллергия на ментол может сопровождаться появлением жжения и изъязвлений в полости рта, лихеноидных высыпаний. Аллергические реакции на ментол могут сопровождаться головной болью, брадикардией, мышечным тремором, атаксией, анафилактическим шоком, эритематозной кожной сыпью. Частота не известна.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

Исследования по оценке взаимодействия не проводились. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

**Срок годности.**

2 года. Не применять препарат после окончания указанного срока годности.

**Условия хранения.**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.  
Хранить в недоступном для детей месте.

НД РБ

5855 - 2017

**Упаковка.**

Таблетки в блистерах №6. 2 блистера вместе с листком-вкладышем помещают в пачку (№6х2);  
5 блистеров вместе с листком-вкладышем помещают в пачку (№6х5); 10 блистеров вместе с  
листком-вкладышем помещают в пачку (№6х10).

Таблетки в блистерах №10 без вложения в пачку. Каждый блистер сопровождается листком-  
вкладышем.

Таблетки в блистерах №10. 5 блистеров вместе с листком-вкладышем помещают в пачку  
(№10х5).

**Название и местонахождение производителя.**

АО «Лубныфарм».

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.

**Категория отпуска.**

Без рецепта.