


26.07.2013г. /V

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ**  
препарата  
**ДЛЯНОС®**



**Международное непатентованное название:** ксилометазолин

Кас на от 02.02.2013

**Химическое название:** 2-[4-(1,1-Диметилэтил)-2,6-диметилбензил]-4,5-дигидро-1Н-имидазола гидрохлорид.

**Лекарственная форма:** спрей назальный

**Состав:** 1 мл препарата содержит:

*Действующее вещество:* ксилометазолина гидрохлорид 1 мг.

*Вспомогательные вещества:* бензалкония хлорид, натрия фосфат однозамещенный, натрия фосфат двузамещенный, динатрия эдетат, натрия хлорид, вода очищенная.

**Описание:** прозрачный, бесцветный раствор без запаха.

**Фармакотерапевтическая группа**

Деконгестанты и другие средства для лечения заболевания носа для наружного применения. Симпатомиметики.

**Код ATX:** R01AA07.

**Фармакологические свойства**

Ксилометазолин относится к группе местных сосудосуживающих средств (деконгестантов) с α-адреномиметическим действием. Альфа-адреностимулятор, ксилометазолин вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой носа, устраняя, таким образом, отек и гиперемию слизистой оболочки носоглотки. Препарат облегчает носовое дыхание при ринитах. В терапевтических концентрациях не раздражает слизистую, не вызывает гиперемию. Действие наступает через несколько минут и продолжается в течение нескольких часов.

**Фармакокинетика**

При местном применении практически не абсорбируется, концентрации в плазме настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами.

**Показания к применению**

Ринит (насморк) различного происхождения, в т.ч. ринит, вызванный простудой, аллергический ринит, поллиноз (сенная лихорадка), синусит.

Средний отит (для уменьшения отека слизистой носоглотки).

Подготовка больного к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, закрытоугольная глаукома, атрофический ринит, трансфеноидальное удаление гипофиза, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе), детский возраст до 6 лет.

Для нос спрей назальный 0,1% – текст листка-вкладыша

**СОГЛАСОВАНО**  
**МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**  
**Приказ Министерства здравоохранения**  
**Республики Беларусь**

**Способ применения и дозы****Взрослым и детям старше 6 лет.**

1 впрыскивание из распылителя в каждый носовой ход. При необходимости можно повторить. Обычно бывает достаточно 3-4-х применений в сутки.

Для того чтобы правильно сделать впрыскивание следует держать распылитель вертикально таким образом, чтобы насадка была направлена вверх. Затем следует поместить насадку в носовой ход, быстро и резко надавить 1 раз на распылитель и вынуть насадку, не разжимая распылитель. Во время впрыскивания следует вдохнуть немного воздуха через нос, что способствует оптимальному введению препарата.

**Побочное действие***Со стороны дыхательной системы*

Для нос может вызвать легкое кратковременное раздражение (жжение или сухость слизистой оболочки носа), особенно у пациентов с чувствительной слизистой оболочкой носа. В некоторых случаях это может привести к увеличению отека слизистой оболочки носа.

Длительное и частое применение и применение высоких доз может вызвать медикаментозный ринит. Это может привести к необратимому повреждению слизистой оболочки носа с образованием корок.

*Со стороны нервной системы:* редко - головная боль, бессонница, усталость.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* редко - сердцебиение, учащение пульса, повышение артериального давления.

*Со стороны иммунной системы:* редко - аллергические реакции (включая одышку и ангионевротический отек).

В случае появления перечисленных побочных реакций или реакций, не упомянутых в данном листке-вкладыше, необходимо обратиться к врачу.

**Передозировка**

Были зафиксированы редкие случаи передозировки у детей. При передозировке отмечались такие симптомы как ускорение и нерегулярность пульса, повышение артериального давления, иногда спутанность сознания. Требуется симптоматическое лечение под медицинским наблюдением.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Системное действие ксилометазолина может усиливаться при одновременном применении с ингибиторами моноаминооксидазы и три- или тетрациклическими антидепрессантами, особенно в случае передозировки ксилометазолина.

**Меры предосторожности**

Не следует применять более 7 дней подряд: продолжительное или чрезмерное использование может вызвать усиленную секрецию слизи и отек слизистой оболочки.

Не превышать рекомендованные дозы.

Следует с осторожностью применять у пациентов с повышенной чувствительностью к симпатомиметикам, что проявляется такими симптомами как бессонница, головокружение, трепет, сердечная аритмия и повышенное кровяное давление.

Следует применять с осторожностью у пациентов с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертиреозом, сахарным диабетом.

**Применение в период беременности и грудного вскармливания**

Длянос спрей назальный 0,1% – текст листка-вкладыша

**СОГЛАСОВАНО**  
**МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**РЕПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**  
**Приказ Министерства здравоохранения**  
**Республики Беларусь**

Не рекомендуется применять Длянос в период беременности. В период грудного вскармливания следует применять Длянос с осторожностью.

**Влияние на способность управлять транспортным средством и работать с механизмами**

Ксилометазолин в дозировках, превышающих рекомендуемые, может влиять на способность управлять транспортным средством или оборудованием.

**Форма выпуска**

По 10 мл в пластиковом распылителе белого цвета из полиэтилена низкой плотности с навинчивающейся крышкой из полиэтилена высокой плотности, снабженной системой контроля первого вскрытия, вместе с инструкцией по применению вложен в пачку из картона.

**Условия хранения**

При температуре не выше 30 °С в местах, недоступных для детей.

**Срок годности:** 3 года. Не использовать после даты, указанной на упаковке.

**Условия отпуска из аптек:** без рецепта

**Производитель**

Сандоз Прайвит Лимитед, Индия

Адрес: Участок № 801/P, зона G.I.D.C., г. Анклешвар, 393002, область Бхаруч, штат Гуджарат, Индия

Sandoz Private Limited, India. Address: Plot No. 801/P, G.I.D.C, Ankleshwar city, 393 002, distr. Bharuch, state Gujarat, India

**Представительство в России/Адрес для претензий**

123317, Москва, Пресненская наб.10,

тел. (495) 969 21 65.

e-mail: consumerhealth@novartis.ru