



## Листок-вкладыш: информация для пациента

### Спирива® Респимат® 2,5 микрограмм раствор для ингаляций Тиотропий

**Перед применением препарата полностью прочтайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.**

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

#### Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата СПИРИВА РЕСПИМАТ.
3. Применение препарата СПИРИВА РЕСПИМАТ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата СПИРИВА РЕСПИМАТ.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

#### 1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ СПИРИВА РЕСПИМАТ, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ помогает людям с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) или бронхиальной астмой для облегчения дыхания. ХОБЛ – это хроническая болезнь легких, которая вызывает одышку и кашель. Термин ХОБЛ ассоциируется с состояниями хронический бронхит и эмфизема. Бронхиальная астма – это хроническое заболевание, характеризующееся воспалением и сужением дыхательных путей.

Поскольку ХОБЛ и бронхиальная астма – это хронические заболевания, вам необходимо применять препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ каждый день, а не только когда у вас возникают проблемы с дыханием или другие симптомы. Для лечения бронхиальной астмы вы должны применять препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ в дополнение к лекарственным средствам, называемым ингаляционными глюкокортикоидами и бета-2-агонистами длительного действия.

Препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ – это бронходилататор длительного действия, который помогает открыть дыхательные пути и облегчает поступление воздуха в легкие и из легких. Регулярное применение препарата СПИРИВА РЕСПИМАТ также может помочь при постоянной одышке, связанной с вашим заболеванием, и минимизировать влияние заболевания на вашу повседневную жизнь. Ежедневное применение препарата СПИРИВА РЕСПИМАТ также поможет предотвратить

любое внезапное, кратковременное ухудшение симптомов ХОБЛ, которые могут продолжаться в течение нескольких дней.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения

Для правильного дозирования препарата СПИРИВА РЕСПИМАТ, пожалуйста,смотрите раздел 3. «Применение препарата СПИРИВА РЕСПИМАТ» и инструкции по использованию ингалятора РЕСПИМАТ, представленные в конце листка-вкладыша.

## 2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА СПИРИВА РЕСПИМАТ

### Не применяйте препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ,

- если у вас аллергия (гиперчувствительность) на тиотропий или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша)
- если у вас аллергия (гиперчувствительность) на атропин или его производные, например, ипратропий или окситропий.

### Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата СПИРИВА РЕСПИМАТ проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если у вас есть закрытоугольная глаукома, проблемы с предстательной железой или трудности с мочеиспусканием.

Если у вас есть проблемы с почками, пожалуйста, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

При применении препарата СПИРИВА РЕСПИМАТ следите за тем, чтобы спрей не попал вам в глаза. Это может привести к боли или дискомфорту в глазах, нечеткости зрения, зрительным ореолам вокруг источников света или цветным образам в сочетании с покраснением глаз (т.е. закрытоугольной глаукоме). Симптомы со стороны глаз могут сопровождаться головной болью, тошнотой или рвотой. Промойте глаза теплой водой, прекратите применение тиотропия бромида и немедленно обратитесь к врачу за дальнейшими рекомендациями.

Если ваше дыхание ухудшилось, или у вас появилась сыпь, отек или зуд непосредственно после использования ингалятора, прекратите его использование и немедленно сообщите об этом лечащему врачу.

Сухость во рту, которая наблюдается при лечении антихолинергическими средствами, может в долгосрочной перспективе быть связана с кариесом зубов. Поэтому, пожалуйста, не забывайте о гигиене полости рта.

Препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ показан для поддерживающего лечения хронической обструктивной болезни легких или бронхиальной астмы. **Не применяйте данный препарат для лечения внезапного приступа одышки или свистящего дыхания (хрипов).** Лечащий врач должен был назначить вам для таких ситуаций другой ингалятор («препарат скорой помощи»). Пожалуйста, соблюдайте инструкции лечащего врача.

Если вам назначили препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ для лечения бронхиальной астмы, его следует добавить к вашему лечению, включающему ингаляционные глюкокортикоиды и бета-2-агонисты длительного действия. Продолжайте применять ингаляционные глюкокортикоиды по назначению лечащего врача, даже если вы чувствуете себя лучше.

Если в течение последних 6 месяцев вы перенесли инфаркт миокарда или в течение последних 12 месяцев у вас было любое нестабильное или угрожающее жизни нарушение ритма сердца, или тяжелая сердечная недостаточность, пожалуйста, сообщите об этом лечащему врачу. Это важно для того, чтобы решить, подходит ли вам препарат СПИРИВА для применения.

Не применяйте препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ чаще одного раза в день.

Вам также следует обратиться к лечащему врачу, если вы чувствуете, что ваше дыхание ухудшается.

Если у вас есть кистозный фиброз (муковисцидоз), сообщите об этом лечащему врачу, потому что препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ может ухудшить симптомы кистозного фиброза.

#### **Дети и подростки**

Препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ не следует применять у детей в возрасте до 6 лет.

#### **Другие препараты и препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты, включая препараты, получаемые без рецепта врача.

В особенности, пожалуйста, сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если вы применяете/применяли антихолинергические препараты, например, ипратропий или окситропий.

Не сообщалось о нежелательных реакциях, вызванных одновременным применением препарата СПИРИВА РЕСПИМАТ с другими препаратами, назначаемыми для лечения ХОБЛ и бронхиальной астмы, такими как ингаляционные бронхолитики для купирования приступа бронхиальной астмы (например, сальбутамол), метилксантины (например, теофиллин), антигистаминные средства, муколитики (например, амброксол), модификаторы лейкотриенов (например, монтелукаст), кромоны, анти-IgE препараты (например омализумаб) и/или ингаляционные или пероральные глюкокортикоиды (например, будесонид, преднизолон).

#### **Беременность и грудное вскармливание**

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Вы не должны применять данный препарат, за исключением случаев, когда препарат推薦ован лечащим врачом.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Исследования о влиянии на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводились. Если появляется головокружение или нечеткость зрения, то это может повлиять на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

#### **Препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ содержит бензалкония хлорид**

Данный препарат содержит 0,0011 мг бензалкония хлорида в каждой ингаляционной дозе.

Бензалкония хлорид может вызвать свистящее дыхание (хрипы) и затруднение дыхания (бронхоспазм), особенно, если у вас есть бронхиальная астма.

### **3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СПИРИВА РЕСПИМАТ**

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ предназначен только для ингаляций.

Рекомендуемая доза для пациентов в возрасте 6 лет и старше:

Препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ действует в течение 24 часов, поэтому вам нужно будет применять препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ только **ОДИН РАЗ В ДЕНЬ**, по возможности в одно и то же время дня. Каждый раз, когда вы будете использовать ингалятор, делайте **ДВЕ ИНГАЛЯЦИИ**.

Поскольку ХОБЛ и бронхиальная астма являются хроническими заболеваниями, применяйте препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ каждый день, а не только тогда, когда у вас возникают проблемы с дыханием. Не применяйте больше рекомендуемой дозы.

Убедитесь, что вы знаете, как правильно пользоваться ингалятором РЕСПИМАТ. Инструкции по использованию ингалятора РЕСПИМАТ приведены в конце данного листка-вкладыша, смотрите подраздел «Инструкция по использованию ингалятора РЕСПИМАТ».

#### **Применение у детей и подростков**

Препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ не следует применять у детей в возрасте до 6 лет в связи с отсутствием данных по безопасности и эффективности.

**Если вы применили препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ больше, чем следовало**  
Если вы применили препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ больше, чем две ингаляции в день, немедленно сообщите лечащему врачу. Вы можете подвергаться более высокому риску возникновения нежелательных реакций, таких как сухость во рту, запор, трудности с мочеиспусканием, учащенное сердцебиение или нечеткость зрения.

#### **Если вы забыли применить препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ**

Если вы забыли применить дозу (**ДВЕ ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ДОЗЫ ОДИН РАЗ В ДЕНЬ**), сделайте ингаляцию, как только вы об этом вспомните, но не применяйте две дозы в одно и тоже время или в один и тот же день. Затем сделайте ингаляцию дозы в следующее обычное для вас время.

**Если вы прекратили применение препарата СПИРИВА РЕСПИМАТ**  
 Перед прекращением применения препарата СПИРИВА РЕСПИМАТ вам нужно проконсультироваться с лечащим врачом или работником аптеки. Если вы прекратите применение препарата СПИРИВА РЕСПИМАТ, признаки и симптомы ХОБЛ и бронхиальной астмы могут ухудшиться.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

#### 4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Оценка нежелательных реакций основана на следующей частоте возникновения:

Часто:	могут возникать не более чем у 1 человека из 10
Нечасто:	могут возникать не более чем у 1 человека из 100
Редко:	могут возникать не более чем у 1 человека из 1000
Частота неизвестна:	исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно

Нежелательные реакции, описанные ниже, наблюдались у людей, применявших данный препарат, и они перечислены согласно частоте: часто, нечасто, редко или частота неизвестна.

Нежелательная реакция	Частота при ХОБЛ	Частота при бронхиальной астме
Сухость во рту	Часто	Нечасто
Охриплость голоса (дисфония)	Нечасто	Нечасто
Кашель	Нечасто	Нечасто
Головная боль	Нечасто	Нечасто
Воспаление горла (фарингит)	Нечасто	Нечасто
Болезненное мочеиспускание (дизурия)	Нечасто	Частота неизвестна
Головокружение	Нечасто	Нечасто
Грибковые инфекции полости рта и горла (орофарингеальный кандидоз)	Нечасто	Нечасто
Трудности с мочеиспусканием (задержка мочи)	Нечасто	Частота неизвестна
Запор	Нечасто	Редко
Сыпь	Нечасто	Нечасто
Зуд (кожный зуд)	Нечасто	Редко
Повышенное внутриглазное давление	Редко	Частота неизвестна
Тяжелые аллергические реакции, которые вызывают отек полости рта и лица или горла (ангионевротический отек)	Редко	Редко



Трудности с засыпанием (бессонница)	Редко	Нечасто
Сердечная аритмия (фибрилляция предсердий, наджелудочковая тахикардия)	Редко	Частота неизвестна
Ощущение сердцебиения (пальпитация)	Редко	Нечасто
Носовое кровотечение (эпистаксис)	Редко	Редко
Воспаление языка (глоссит)	Редко	Частота неизвестна
Учащенное сокращение сердца (тахикардия)	Редко	Частота неизвестна
Тяжесть в груди, связанная с кашлем, свистящим дыханием (хрипами) или одышкой непосредственно после ингаляции (бронхоспазм)	Редко	Нечасто
Затрудненное глотание (дисфагия)	Редко	Частота неизвестна
Зрительные ореолы вокруг источников света или цветные образы в сочетании с покраснением глаз (глаукома)	Редко	Частота неизвестна
Нечеткость зрения	Редко	Частота неизвестна
Воспаление горлани (ларингит)	Редко	Частота неизвестна
Кариес зубов	Редко	Частота неизвестна
Воспаление десен (гингивит)	Редко	Редко
Крапивница (уртикария)	Редко	Редко
Инфекции кожи или язвы кожи	Редко	Частота неизвестна
Сухость кожи	Редко	Частота неизвестна
Инфекции мочевыводящих путей	Редко	Редко
Изжога (гастроэзофагеальный рефлюкс)	Редко	Частота неизвестна
Гиперчувствительность, включая реакции немедленного типа	Частота неизвестна	Редко
Воспаление в полости рта (стоматит)	Частота неизвестна	Редко
Уменьшение количества жидкости в организме (дегидратация)	Частота неизвестна	Частота неизвестна
Воспаление пазух носа (синусит)	Частота неизвестна	Частота неизвестна
Закупорка кишечника или отсутствие дефекации (кишечная непроходимость, включая паралитический илеус)	Частота неизвестна	Частота неизвестна
Чувство тошноты (тошнота)	Частота неизвестна	Частота неизвестна

Тяжелая аллергическая реакция (анафилактическая реакция)	Частота неизвестна	Частота неизвестна
Припухлость суставов	Частота неизвестна	Частота неизвестна

Аллергические реакции немедленного типа, такие как сыпь, крапивница (уртикария), отек в полости рта и отек лица или внезапные затруднения дыхания (ангионевротический отек) или другие реакции гиперчувствительности (такие как внезапное снижение артериального давления или головокружение), могут возникать отдельно или как часть тяжелой аллергической реакции (анафилактическая реакция) после применения препарата СПИРИВА РЕСПИМАТ. Как и при применении всех ингаляционных препаратов, у некоторых пациентов может наблюдаться неожиданная тяжесть в груди, кашель, свистящее дыхание или одышка непосредственно после ингаляции (бронхоспазм). Если произойдет что-либо из этого, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории Республики Беларусь. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

#### **5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СПИРИВА РЕСПИМАТ**

Хранить в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на картонной пачке после «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Хранить при температуре не выше 25°C. Не замораживать.

Использовать в течение 3 месяцев после первой ингаляции.

Не выбрасывайте препараты в канализацию или с бытовыми отходами. Уточните у работника аптеки как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

#### **6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ**

##### **Препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ содержит**

Действующим веществом является тиотропий.

Ингаляционная доза содержит 2,5 микрограмм (мкг) тиотропия, что эквивалентно 3,124 мкг тиотропия бромида моногидрата.

Две ингаляционные дозы соответствуют одной терапевтической дозе.

Ингаляционная доза – это количество препарата, которое доступно пациенту после прохождения через мундштук.

Прочими вспомогательными веществами являются бензалкокония хлорид, динатрия эдэтат, вода очищенная и хлористоводородная кислота для коррекции pH.

**Внешний вид препарата СПИРИВА РЕСПИМАТ и содержимое упаковки**

Раствор для ингаляций 2,5 мкг/ингаляционная доза в картридже 4,5 мл, состоящем из пластикового контейнера, помещенного в алюминиевый цилиндр для ингалятора РЕСПИМАТ, с защитой от вскрытия. Картридж в комплекте с ингалятором РЕСПИМАТ и инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата в картонной пачке в упаковке №1.

**Условия отпуска из аптек**

По рецепту врача

**Держатель регистрационного удостоверения**

Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ  
Бингер штрассе 173  
55216 Ингельхайм-на-Рейне  
Германия

**Производитель**

Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ  
Бингер штрассе 173  
55216 Ингельхайм-на-Рейне  
Германия

**Агентство в РБ**

г. Минск, ул. В. Хоружей, 22-1402  
Тел.: (+375 17) 242 16 33, тел./факс: (+375 17) 242 16 40

**Данный листок-вкладыш пересмотрен**

15.05.2023

**Инструкция по использованию ингалятора РЕСПИМАТ**

РЕСПИМАТ – это ингалятор, который образует спрей для ингаляций. Ингалятор РЕСПИМАТ предназначен только для вас/только для вашего ребенка. Один картридж предназначен для многократного применения.

Детям следует применять препарат СПИРИВА РЕСПИМАТ с помощью взрослых.

Прочтите эту инструкцию перед началом применения препарата СПИРИВА РЕСПИМАТ.

Вам будет нужно использовать данный ингалятор только ОДИН РАЗ В ДЕНЬ. Каждый раз, когда вы будете использовать ингалятор, делайте ДВЕ ИНГАЛЯЦИИ.



- Если ингалятор СПИРИВА РЕСПИМАТ не использовался более 7 дней, направьте его перед применением вниз и нажмите 1 раз на кнопку подачи дозы.
- Если ингалятор СПИРИВА РЕСПИМАТ не использовался более 21 дня, повторите действия 4-6 из подраздела «Подготовка к первому применению» до получения видимого аэрозольного облачка. Затем повторите действия 4-6 еще три раза.
- Не трогайте прокалывающий элемент внутри прозрачной гильзы.


### **Уход за ингалятором РЕСПИМАТ**

Протирайте мундштук, включая металлическую часть внутри мундштука, только влажной салфеткой или тканью не реже одного раза в неделю.

Небольшое обесцвечивание мундштука не влияет на работу ингалятора РЕСПИМАТ.

При необходимости протирайте наружную поверхность ингалятора РЕСПИМАТ влажной салфеткой.

### **Когда нужен новый ингалятор**



- Ингалятор СПИРИВА РЕСПИМАТ содержит 60 ингаляционных доз (30 терапевтических доз) при применении согласно рекомендованному режиму дозирования (две ингаляционные дозы один раз в день).
- Индикатор доз показывает, сколько приблизительно доз еще осталось в ингаляторе.
- Когда указатель индикатора доз достигает красной области шкалы, это означает, что лекарственного препарата осталось приблизительно на 7 дней применения (14 ингаляционных доз).
- Когда указатель индикатора доз достигнет конца красной области шкалы, произойдет автоматическое блокирование ингалятора СПИРИВА РЕСПИМАТ,

т.е. вы больше не сможете использовать ингалятор СПИРИВА РЕСПИМАТ. С этого момента поворот прозрачной гильзы будет невозможен.

- Ингалятор СПИРИВА РЕСПИМАТ необходимо заменить новым через 3 месяца после подготовки к первому применению, даже если препарат был использован не полностью.

### Подготовка к первому применению

#### 1. Снимите прозрачную гильзу

- Колпачок должен быть закрыт.
- Нажмите стопорную кнопку, при этом другой рукой сильно тяните прозрачную гильзу вниз.



#### 2. Вставьте картридж

- Вставьте картридж в ингалятор.
- Поставьте ингалятор на твердую поверхность и сильно нажмите на картридж до щелчка.
- Нельзя вынимать картридж, уже установленный в ингалятор.



#### 3. Поставьте на место прозрачную гильзу

- Поставьте на место прозрачную гильзу до щелчка.
- После этого больше не снимайте прозрачную гильзу.



#### 4. Поверните

- Колпачок должен быть закрыт.
- Поверните прозрачную гильзу в направлении черных стрелок на этикетке до щелчка (половина оборота).



#### 5. Откройте

- Полностью откройте колпачок.



#### 6. Нажмите

- Направьте ингалятор вниз.
- Нажмите на кнопку подачи дозы.
- Закройте колпачок.
- Повторите действия 4-6 до появления видимого аэрозольного облачка.

- После появления видимого аэрозольного облачка повторите действия 4-6 еще три раза.

Теперь ваш ингалятор готов к использованию. Ваш ингалятор содержит 60 ингаляционных доз (30 терапевтических доз).



### Ежедневное использование ингалятора СПИРИВА РЕСПИМАТ

#### ПОВЕРНИТЕ

- Колпачок должен быть закрыт.
- ПОВЕРНИТЕ** прозрачную гильзу в направлении черных стрелок на этикетке до щелчка (половина оборота).



#### ОТКРОЙТЕ

- Полностью **ОТКРОЙТЕ** колпачок.



**НАЖМИТЕ**

- Медленно и глубоко выдохните.
- Обхватите губами мундштук, не закрывая отверстия для воздуха. Ингалятор должен быть направлен к задней части горла.
- Во время медленного и глубокого вдоха через рот **НАЖМИТЕ** кнопку подачи дозы и продолжайте медленный вдох как можно дольше.
- Задержите дыхание на 10 секунд или настолько, насколько у вас получится.
- Повторите действия **«ПОВЕРНИТЕ», «ОТКРОЙТЕ», «НАЖМИТЕ** для второй ингаляционной дозы.
- Закройте колпачок до следующего использования ингалятора.

**Ответы на часто задаваемые вопросы**

**Трудно вставить картридж достаточно глубоко.**

**Вы случайно повернули прозрачную гильзу перед вставкой картриджа?**  
Откройте колпачок, нажмите кнопку подачи дозы, затем вставьте картридж.

**Я не могу нажать кнопку подачи дозы.**

**Вы повернули прозрачную гильзу?** Если нет, поверните прозрачную гильзу непрерывным движением до щелчка (половина оборота).

**Достиг ли указатель индикатора доз красной области шкалы?** Ваш картридж израсходован.

**Я не могу повернуть прозрачную гильзу.**

**Вставлена ли прозрачная гильза плотно, и достиг ли указатель индикатора доз красной области шкалы?** Ваш картридж израсходован.


**Вы уже повернули прозрачную гильзу?**

Если прозрачную гильзу уже повернули, выполните действия **«ОТКРОЙТЕ»** и **«НАЖМИТЕ»** из подраздела **«Ежедневное использование ингалятора СПИРИВА РЕСПИМАТ»**, чтобы применить препарат.

**Мой СПИРИВА РЕСПИМАТ закончился слишком рано.**

**Часто ли вы распыляли препарат в воздух, чтобы проверить, работает ли ингалятор СПИРИВА РЕСПИМАТ?** После того, как вы подготовили СПИРИВА РЕСПИМАТ к применению, при ежедневном использовании пробное распыление не требуется.

**Мой СПИРИВА РЕСПИМАТ не образует спрей для ингаляций.**



**Вы вставили картридж?** Если нет, вставьте картридж. После сборки СПИРИВА РЕСПИМАТ не снимайте прозрачную гильзу до тех пор, пока картридж не будет израсходован.

**Повторили ли вы действия «ПОВЕРНИТЕ», «ОТКРОЙТЕ», «НАЖМИТЕ» менее трех раз после установки картриджа?** Повторите действия «ПОВЕРНИТЕ», «ОТКРОЙТЕ», «НАЖМИТЕ» три раза после установки картриджа согласно действиям 4-6 из подраздела «Подготовка к первому применению».

**Достиг ли указатель индикатора доз красной области шкалы?** Ваш картридж израсходован.

**Мой СПИРИВА РЕСПИМАТ образует спрей для ингаляций автоматически.**

**Был ли колпачок открыт, когда вы поворачивали прозрачную гильзу?**  
Закройте колпачок, затем поверните прозрачную гильзу.

**Нажимали ли вы кнопку подачи дозы при повороте прозрачной гильзы?**  
Закройте колпачок так, чтобы кнопка подачи дозы была закрыта, затем поверните прозрачную гильзу.

**Вы делали паузу при повороте прозрачной гильзы до того, как она щелкнула?** Поверните прозрачную гильзу непрерывным движением до щелчка (половина оборота).