


**ПЕКТОЛВАН® ПЛЮЩ**  
(Pectolvan Hedera Helix)



**Общая характеристика**

*Описание готовой лекарственной формы:* прозрачная жидкость светло-коричневого цвета с запахом вишни и сладким фруктовым вкусом, возможно появление легкой опалесценции.

*Международное непатентованное название:* Hederae helicis folium.

**Состав лекарственного средства**

1 мл препарата содержит:

*действующее вещество:* плюща обыкновенного листьев экстракта сухого 7 мг (соотношение сырье: препарат – (4-8): 1 (экстрагент - этанол 30%));

*вспомогательные вещества:* натрия цитрат; кислота лимонная моногидрат; сорбит (Е 420) – 385 мг; калия сорбат – 1,34 мг; ксантановая камедь; ароматизатор пищевой «Вишня 667» (растворитель пропиленгликоль – 0,125 мг); вода очищенная;

2,5 мл сиропа содержат 963 мг сахарозаменителя сорбита = 0,080 хлебных единиц.

**Форма выпуска**

Сироп.

**Код классификации лекарственного средства**

Код АТС: R05CA12. Отхаркивающие средства.

**Фармакологические свойства**

*Фармакодинамика*

Действующим веществом лекарственного средства является сухой экстракт листьев плюща. Механизм действия не установлен. Отхаркивающее действие предположительно связано с раздражением слизистой оболочки желудка, при котором рефлекторно стимулируются секреторные бронхиальные железы слизистой оболочки бронхов.

*Фармакокинетика*

Лекарственное средство содержит различные биологически активные вещества, фармакокинетические исследования не проведены.

**Показания к применению**

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся кашлем.

**Способ применения и дозировка**

Препарат применяют внутрь, используя мерную ложечку.

Перед каждым применением сиропа флакон необходимо тщательно встряхнуть.

<i>Детям от 2 до 6 лет –</i>	по 2,5 мл 2 раза в сутки. Максимальная суточная доза 5 мл сиропа (35 мг экстракта).
<i>Детям от 6 до 12 лет –</i>	по 2,5 мл 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза 10 мл сиропа (70 мг экстракта).
<i>Взрослым и детям старше 12 лет –</i>	по 5-7,5 мл 2-3 раза в сутки. Максимальная суточная доза 15 мл сиропа (105 мг экстракта).

Рекомендуемая продолжительность приема составляет 7 дней. Длительность курса лечения определяется врачом индивидуально, с учетом особенностей заболевания, достигнутого

терапевтического эффекта и переносимости лекарственного средства. В случае отсутствия эффекта следует обратиться к врачу.

НД РБ

### **Побочные реакции**

9051 - 2021

Возможно появление желудочно-кишечных расстройств (тошнота, рвота, диарея), аллергических реакций (зуд, гиперемия, крапивница, кожная сыпь, купероз (телеангиэктазия), диспноэ).

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, а также растениям семейства аралиевых (Araliaceae). Непереносимость фруктозы.

Прием лекарственного средства противопоказан детям до 2 лет из-за риска утяжеления симптомов респираторного заболевания.

### **Передозировка**

При применении лекарственного средства в дозе, превышающей суточную дозу в 3 раза, могут появиться тошнота, рвота, диарея и возбуждение, что требует немедленного обращения к врачу.

*Лечение:* симптоматическое.

### **Меры предосторожности**

Необходимо с осторожностью принимать лекарственное средство пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или в случае ухудшения состояния (возникновение одышки, повышение температуры, появление мокроты с примесью гноя или крови), следует немедленно проконсультироваться с врачом.

*Указание для пациентов с сахарным диабетом.*

2,5 мл сиропа содержат 963 мг сахарозаменителя сорбита = 0,080 хлебных единиц.

Сорбит может оказывать легкое слабительное действие.

Из-за содержания сорбита лекарственное средство не рекомендуется для приема пациентам с непереносимостью фруктозы.

*Дети.*

Лекарственное средство противопоказано детям до 2 лет из-за риска утяжеления симптомов респираторного заболевания. Применение лекарственного средства у детей в возрасте 2-4 лет возможно только после консультации врача.

*Применение в период беременности или кормления грудью.*

Безопасность применения в период беременности и кормления грудью не установлена. В связи с отсутствием данных прием лекарственного средства во время беременности и лактации не рекомендован.

*Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.*


Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не рекомендовано одновременное применение с противокашлевыми лекарственными средствами, такими как, кодеин или декстрометорфан.

### **Условия и срок хранения**

Срок годности – 2 года.



После первого вскрытия флакона препарат можно применять в течение 90 дней.  
Хранить при температуре не выше 25 °С.  
Хранить в недоступном для детей месте.  
Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска**  
Без рецепта.

НД РБ

9051 - 2021

**Упаковка**

По 100мл во флаконы стеклянные с винтовой горловиной из коричневого стекла, завинченные крышками винтовыми с кольцом контроля раскрытия.  
Каждый флакон вместе с дозирующей ложкой и инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

**Информация о производителе**

ПАО «Фармак». Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 63.

