



НД РБ

9086 - 2021

Boehringer
Ingelheim

Листок-вкладыш: информация для пациента

Джардинс® 10 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Джардинс® 25 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Эмпаглифлозин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.
- Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат ДЖАРДИНС, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед приемом препарата ДЖАРДИНС.
3. Прием препарата ДЖАРДИНС.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ДЖАРДИНС.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ДЖАРДИНС, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Что из себя представляет препарат ДЖАРДИНС

Препарат ДЖАРДИНС содержит действующее вещество эмпаглифлозин.

Препарат ДЖАРДИНС относится к группе лекарственных препаратов, называемой ингибиторами натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа (SGLT2).

Для чего применяют препарат ДЖАРДИНС

Сахарный диабет 2 типа

- Препарат ДЖАРДИНС принимают для лечения сахарного диабета 2 типа у взрослых пациентов (возраст 18 лет и старше), недостаточно контролируемого диетой и физической нагрузкой.
- Препарат ДЖАРДИНС может приниматься без других лекарственных средств пациентами, которые не могут принимать метформин (другое лекарственное средство для лечения сахарного диабета).
- Препарат ДЖАРДИНС может также приниматься с другими лекарственными средствами для лечения сахарного диабета. Это могут быть лекарственные средства, которые принимаются внутрь или применяются в виде инъекции, например, инсулин.

Действие препарата ДЖАРДИНС заключается в блокировке белка SGLT2 в почках. Это приводит к удалению сахара (глюкозы) из крови с мочой. Таким образом препарат ДЖАРДИНС снижает количество сахара в крови.

Данный препарат также может помочь предотвратить заболевания сердца у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Важно, чтобы вы продолжали придерживаться плана диеты и физической нагрузки в соответствии с указаниями лечащего врача, работника аптеки или медицинской сестры.

Сердечная недостаточность

- Препарат ДЖАРДИНС принимают для лечения сердечной недостаточности у взрослых пациентов с симптомами, связанными с нарушением функции сердца.

Хроническая болезнь почек

- Препарат ДЖАРДИНС принимают для лечения хронической болезни почек у взрослых пациентов.

Что такое сахарный диабет 2 типа?

Сахарный диабет 2 типа – это заболевание, причиной которого являются как гены, так и образ жизни. Если у вас сахарный диабет 2 типа, ваша поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина для контроля уровня глюкозы в крови, и ваш организм не может эффективно использовать свой собственный инсулин. Это приводит к высокому уровню глюкозы в крови, что вызывает такие проблемы со здоровьем, как заболевания сердца, почек, слепота и плохое кровообращение в конечностях.

Что такое сердечная недостаточность?

Сердечная недостаточность возникает, когда сердце слишком слабое или напряженное и не может правильно работать. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем и необходимости лечения в стационаре. Наиболее частыми симптомами сердечной недостаточности являются ощущение одышки, чувство усталости или постоянной сильной усталости, а также отечность голеностопных суставов.

Препарат ДЖАРДИНС помогает защитить сердце от ухудшения состояния и уменьшить симптомы заболевания.

Что такое хроническая болезнь почек?

Хроническая болезнь почек – это длительное заболевание, которое может быть вызвано другими состояниями, такими как сахарный диабет, высокое артериальное давление или даже вашей собственной иммунной системой, атакующей почки. При хронической болезни почек ваши почки могут постепенно терять свою способность должным образом очищать и фильтровать кровь. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как отеки ног, сердечная недостаточность или необходимость в стационарном лечении.

Препарат ДЖАРДИНС помогает защитить почки от потери их функции.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА ДЖАРДИНС

Не принимайте препарат ДЖАРДИНС,

- если у вас аллергия на эмпаглифлозин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Немедленно обратитесь к врачу или в ближайшую больницу:

Кетоацидоз

- если вы быстро теряете массу тела, плохо себя чувствуете или у вас есть тошнота, боль в животе, чрезмерная жажда, быстрое и глубокое дыхание, спутанность сознания, необычная сонливость или усталость, сладкий запах изо рта, сладкий или металлический привкус во рту или измененный запах мочи или пота, немедленно обратитесь к врачу или в ближайшую больницу. Данные симптомы могут быть признаком кетоацидоза – серьезной, иногда опасной для жизни проблемы, с которой вы можете столкнуться из-за повышенного уровня кетоновых тел в моче или крови, наблюдаемого в результатах анализов. Риск развития кетоацидоза может увеличиваться при длительном голодании, чрезмерном употреблении алкоголя, обезвоживании, внезапном снижении дозы инсулина или повышении потребности в инсулине в связи с серьезной операцией или тяжелым заболеванием.

Сообщите лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре перед началом приема данного лекарственного препарата или во время лечения,

- если у вас сахарный диабет 1 типа. Данный тип сахарного диабета обычно начинается в молодом возрасте, и ваш организм не вырабатывает инсулин. Вам не следует принимать препарат ДЖАРДИНС, если у вас сахарный диабет 1 типа.
- если у вас тяжелые нарушения функции почек. Лечащий врач может ограничить дозу препарата до 10 мг один раз в сутки или может назначить вам прием другого лекарственного средства (см. также раздел 3 «Прием препарата ДЖАРДИНС»).
- если у вас тяжелые нарушения функции печени. Лечащий врач может назначить вам прием другого лекарственного средства.
- если может возникнуть риск обезвоживания, например,
 - если вы испытываете тошноту, у вас диарея или повышенная температура, или если вы не можете есть или пить;
 - если вы принимаете лекарственные средства, которые повышают выработку мочи (диуретики) или снижают артериальное давление;
 - если вам 75 лет или больше.

Возможные признаки перечислены в разделе 4 листка-вкладыша, в подразделе «Обезвоживание». Лечащий врач может отменить прием препарата ДЖАРДИНС до вашего выздоровления, чтобы предотвратить потерю слишком большого количества жидкости из организма. Спросите его о способах профилактики обезвоживания.

- если у вас тяжелое инфекционное заболевание почек или мочевыводящих путей с повышенной температурой. Лечащий врач может отменить прием препарата ДЖАРДИНС до вашего выздоровления.

Немедленно обратитесь к лечащему врачу, если у вас появились следующие симптомы в комбинации: боль, болезненная чувствительность, покраснение или

отечность половых органов или в области между гениталиями и задним проходом, в сочетании с повышенной температурой или общим недомоганием. Эти симптомы могут быть признаком редкой, но серьезной и даже опасной для жизни инфекции (некротизирующий фасциит промежности или гангрена Фурнье), которая разрушает ткани под кожей. Необходимо немедленно начать лечение гангрены Фурнье.

Уход за ногами

Как и всем пациентам с сахарным диабетом важно регулярно проверять свои ноги и придерживаться любых других рекомендаций медицинского работника по уходу за ногами.

Функция почек

Состояние почек должно проверяться до начала и во время приема препарата.

Глюкоза в моче

В связи с принципом действия препарата анализ мочи на глюкозу даст положительный результат во время приема данного препарата.

Дети и подростки

Препарат ДЖАРДИНС не рекомендован для детей и подростков в возрасте до 18 лет в связи с отсутствием исследований у данных пациентов.

Другие препараты и препарат ДЖАРДИНС

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Очень важно сообщить лечащему врачу,

- если вы принимаете лекарственные средства, которые повышают выработку мочи (диуретики). Лечащий врач может отменить прием препарата ДЖАРДИНС. Возможные признаки потери слишком большого количества жидкости организмом перечислены в разделе 4 листка-вкладыша.
- если вы принимаете другие лекарственные средства, снижающие уровень сахара в крови, такие как инсулин или производное сульфонилмочевины. Лечащий врач может снизить дозы других лекарственных средств для предотвращения слишком низкого уровня сахара в крови (гипогликемия).
- если вы принимаете препараты лития, так как препарат ДЖАРДИНС может снижать уровень лития в крови.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Не принимайте препарат ДЖАРДИНС, если вы беременны. Неизвестно опасен ли препарат ДЖАРДИНС для ожидаемого ребенка. Не принимайте препарат ДЖАРДИНС, если вы кормите грудью. Неизвестно проникает ли препарат в грудное молоко человека.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат ДЖАРДИНС оказывает несущественное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Одновременный прием данного препарата с лекарственными средствами, относящимися к производным сульфонилмочевины, или инсулином может привести к слишком низкому уровню сахара в крови (гипогликемия), что может вызвать такие симптомы, как дрожь, потливость и изменение остроты зрения, и может повлиять на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами. Не управляйте транспортным средством и не используйте никакие инструменты или механизмы, если вы чувствуете головокружение во время приема препарата ДЖАРДИНС.

Препарат ДЖАРДИНС содержит лактозу

Препарат ДЖАРДИНС содержит лактозу (молочный сахар). Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного препарата.

Препарат ДЖАРДИНС содержит натрий

Данный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на таблетку, то есть по сути не содержит натрий.

3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА ДЖАРДИНС

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

- Рекомендуемая доза препарата ДЖАРДИНС – одна таблетка 10 мг один раз в сутки. Если у вас сахарный диабет 2 типа, лечащий врач примет решение о возможности увеличения дозы до 25 мг один раз сутки, если это необходимо, чтобы помочь контролировать уровень сахара в крови.
- Если у вас есть нарушение функции почек, лечащий врач может ограничить дозу до 10 мг один раз в сутки.
- Лечащий врач назначит дозу, которая подходит вам. Не меняйте дозу без рекомендации врача.

Как принимать препарат

- Проглатывайте таблетку целиком, запивая водой.
- Вы можете принять таблетку независимо от приема пищи.
- Вы можете принять таблетку в любое время суток. Однако старайтесь принимать препарат в одно и тоже время суток, это поможет вам не забыть принять препарат.

Если у вас сахарный диабет 2 типа, лечащий врач может назначить препарат ДЖАРДИНС одновременно с другим препаратом для лечения сахарного диабета. Не забывайте принимать все назначенные лечащим врачом лекарственные средства для достижения лучшего результата для вашего здоровья.

Соответствующая диета и физическая нагрузка помогут вашему организму лучше расходовать сахар в крови. Во время приема препарата ДЖАРДИНС важно соблюдать план диеты и физической нагрузки, рекомендованный лечащим врачом.

Если вы приняли препарата ДЖАРДИНС больше, чем следовало

Если вы приняли препарата ДЖАРДИНС больше, чем следовало, немедленно сообщите об этом лечащему врачу или обратитесь за медицинской помощью. Возьмите с собой упаковку препарата.

Если вы забыли принять препарат ДЖАРДИНС

Что делать, если вы забыли принять таблетку, зависит от того, сколько времени осталось до приема следующей дозы препарата.

- Если до приема следующей дозы препарата осталось 12 часов или больше, примите препарат ДЖАРДИНС, как только об этом вспомните. Затем примите следующую дозу препарата в обычное время.
- Если до приема следующей дозы препарата осталось менее 12 часов, пропустите прием дозы препарата. Затем примите следующую дозу препарата в обычное время.
- Не принимайте двойную дозу препарата ДЖАРДИНС, чтобы компенсировать пропущенную дозу препарата.

Если вы прекратили прием препарата ДЖАРДИНС

Не прекращайте прием препарата ДЖАРДИНС без предварительной консультации с лечащим врачом. Если у вас сахарный диабет 2 типа, уровень сахара в крови может увеличиться, если вы прекратите прием препарата ДЖАРДИНС.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Немедленно обратитесь к врачу или в ближайшую больницу, если у вас есть какие-либо из следующих нежелательных реакций:

Тяжелая аллергическая реакция, встречается нечасто (может возникать не более чем у 1 человека из 100)

Возможные признаки тяжелой аллергической реакции могут включать:

- отек лица, губ, рта, языка или глотки, что может привести к затруднению дыхания или глотания.

Кетоацидоз, встречается нечасто (может возникать не более чем у 1 человека из 100)

Признаки кетоацидоза (см. также раздел 2 листка-вкладыша, подраздел «Особые указания и меры предосторожности»):

- повышенный уровень кетоновых тел в моче или крови;
- быстрая потеря массы тела;
- плохое самочувствие или тошнота;
- боль в животе;
- чрезмерная жажда;
- быстрое и глубокое дыхание;
- спутанность сознания;
- необычная сонливость или усталость;

- сладкий запах изо рта, сладкий или металлический вкус во рту, или измененный запах мочи или пота.

Кетоацидоз может возникнуть независимо от уровня глюкозы в крови. Лечащий врач может принять решение приостановить или прекратить ваше лечение препаратом ДЖАРДИНС.

Как можно быстрее обратитесь к врачу, если вы отмечаете следующие нежелательные реакции:

Низкий уровень сахара (гипогликемия), встречается очень часто (может возникать у более чем 1 человека из 10)

Если вы принимаете препарат ДЖАРДИНС с другим лекарственным средством, которое может привести к снижению уровня сахара в крови, таким как производное сульфонилмочевины или инсулин, у вас повышен риск снижения уровня сахара в крови. Признаки низкого уровня сахара в крови включают:

- дрожь, потение, чувство сильного беспокойства или спутанность сознания, учащенное сердцебиение;
- резкое усиление чувства голода, головная боль.

Лечащий врач расскажет вам, что делать, если уровень сахара в крови низкий, и если у вас появятся какие-либо из вышеперечисленных признаков. Если у вас есть симптомы низкого уровня сахара в крови, съешьте таблетки глюкозы, или что-нибудь с высоким содержанием сахара или выпейте фруктовый сок. Измерьте уровень сахара в крови, если это возможно, и отдохните.

Инфекция мочевыводящих путей, встречается часто (может возникать не более чем у 1 человека из 10)

Признаки инфекции мочевыводящих путей следующие:

- ощущение жжения при мочеиспускании;
- моча кажется мутной;
- боль в области таза или боль в середине спины (при инфекционном заболевании почек).

Позывы к мочеиспусканию или более частое мочеиспускание могут быть вызваны действием препарата ДЖАРДИНС, но также они могут быть признаками инфекции мочевыводящих путей. Если вы заметили ухудшение данных симптомов, вам также следует обратиться к лечащему врачу.

Обезвоживание, встречается очень часто (может возникать у более чем 1 человека из 10)

Признаки обезвоживания не специфические, но могут включать:

- необычную жажду;
- предобморочное состояние или головокружение при вставании;
- обморок или потерю сознания.

Другие нежелательные реакции во время приема препарата ДЖАРДИНС

Часто

- кандидоз половых органов (кандидоз полости рта);
- выделение больше обычного количества мочи или необходимость более частого мочеиспускания;
- зуд;

- сыпь или покраснение кожи, вызывающие зуд, с пузырьками, содержащими сочающуюся жидкость, или волдырями;
- жажда;
- анализы крови могут показать повышение уровня липидов в крови (холестерин);
- запор.

Нечасто

- крапивница;
- напряжение или боль при опорожнении мочевого пузыря;
- анализы крови могут показать снижение функции почек (креатинин или мочевина);
- анализы крови могут показать увеличение количества красных кровяных клеток в крови (гематокрит).

Редко

- некротизирующий фасциит промежности или гангрена Фурнье, тяжелая инфекция мягких тканей половых органов или области между половыми органами и задним проходом.

Очень редко

- воспаление почек (тубулоинтерстициальный нефрит).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом, работником аптеки или медицинской сестрой. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через www.rceth.by. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ДЖАРДИНС

Хранить в недоступном для детей месте.

Не принимайте препарат после истечения срока годности, указанного на блистере и картонной пачке после «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Хранить при температуре не выше 25°C.

Не принимайте данный препарат, если вы заметили, что упаковка повреждена или на ней есть следы вскрытия.

Не выбрасывайте препараты в канализацию или с бытовыми отходами. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат ДЖАРДИНС содержит

- Действующим веществом является эмпаглифлозин.

- Каждая таблетка содержит 10 мг или 25 мг эмпаглифлозина.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

- Прочими вспомогательными веществами являются:
 - ядро таблетки: лактозы моногидрат (см. раздел 2 листка-вкладыша подраздел «Препарат ДЖАРДИНС содержит лактозу»), целлюлоза микрокристаллическая, гидроксипропилцеллюлоза, натрия кроскармеллоза (см. раздел 2 листка-вкладыша подраздел «Препарат ДЖАРДИНС содержит натрий»), кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат;
 - пленочная оболочка: Опадрай® желтый 02B38190 (гипромеллоза, титана диоксид (Е171), тальк, макрогол 400, оксида железа желтый (Е172)).

Внешний вид препарата ДЖАРДИНС и содержимое упаковки

ДЖАРДИНС 10 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Бледно-желтые, круглые, двояковыпуклые, со скошенными краями таблетки, покрытые пленочной оболочкой. На одной стороне таблетки гравировка символа компании «Берингер Ингельхайм», на другой – «S10».

ДЖАРДИНС 25 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Бледно-желтые, овальные, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой. На одной стороне таблетки гравировка символа компании «Берингер Ингельхайм», на другой – «S25».

По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги/ПВХ.

По 3 блистера с инструкцией по медицинскому применению в картонную пачку.

Условия отпуска из аптек

Отпуск по рецепту врача.

Держатель регистрационного удостоверения

Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ

Бингер Штрассе 173

55216 г. Ингельхайм-на-Рейне

Германия

Производитель

Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ

Бингер Штрассе 173

55216 г. Ингельхайм-на-Рейне

Германия

Роттендорф Фарма ГмбХ

Остенфельдер Штрассе 51–61

59320 г. Эннигерло

Германия

Агентство в РБ

г. Минск, ул. В. Хоружей, 22-1402

Тел.: (+375 17) 242 16 33, тел./факс: (+375 17) 242 16 40

Данный листок-вкладыш пересмотрен

11.11.2023