



Листок-вкладыш - информация для пациента

РЕКРЕОЛ® , 50 мг/г, крем для наружного применения

Действующее вещество: декспантенол

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается через 7 дней или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Рекреол® и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Рекреол®.
3. Применение препарата Рекреол®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Рекреол®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Рекреол®, и для чего его применяют

Крем Рекреол® содержит действующее вещество – декспантенол, который относится к группе препаратов для лечения ран и язв. В тканях декспантенол превращается в пантотеновую кислоту. Пантотеновая кислота восстанавливает эластичность кожи и стимулирует заживление ран.

Показания к применению

Крем Рекреол® применяют для поддерживающего лечения поверхностных повреждений кожи (небольших ожогов и трещин кожи, ссадин и растрескиваний кожи), воспаления кожи (возникающего при воздействии лучевой терапии, фототерапии или ультрафиолетового излучения).

Крем Рекреол® показан к применению у взрослых и детей.

Если улучшение не наступило через 7 дней или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.



2. О чем следует знать перед применением препарата Рекреол®

Не применяйте препарат Рекреол®:

- если у Вас аллергия на декспантенол или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- не наносите крем на раны, если у Вас гемофилия, так как есть риск кровотечения.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Рекреол® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Крем только для наружного применения.

Следует избегать случайного попадания крема Рекреол® в глаза.

Применения крема Рекреол® следует прекратить в случае возникновения признаков аллергической реакции.

Другие препараты и препарат Рекреол®

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Нет данных о том, что крем Рекреол® взаимодействует с другими препаратами.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Применять только по рекомендациями врача.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Крем Рекреол® не влияет на способность управлять транспортными средствами и обслуживать механизмы.

Препарат Рекреол® содержит ланолин, стеариловый и цетиловый спирты, которые могут вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

Препарат Рекреол® содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи.

3. Применение препарата Рекреол®

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или в соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза для детей и взрослых

Если не указано иначе, крем наносят тонким слоем на поврежденный участок кожи один или несколько раз в день.

Продолжительность курса лечения зависит от характера и степени тяжести заболевания.

Если Вы не чувствуете себя лучше спустя 7 дней или чувствуете себя хуже после начала применения, Вам следует проконсультироваться с врачом.



Декспантенол показан к применению у детей.

Если Вам кажется, что действие крема Рекреол® слишком сильное или слишком слабое, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Способ применения

Только для наружного применения.

Продолжительность курса лечения зависит от характера и степени тяжести заболевания. Большинство исследований местного действия декспантенола было краткосрочным, как правило, 3–4 недели.


При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам крем Рекреол® может вызывать нежелательные реакции, однако, они возникают не у всех.

Очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000:

- аллергические реакции,
- контактный дерматит,
- аллергический дерматит,
- зуд,
- покраснение кожи,
- экзема,
- высыпания,
- крапивница,
- раздражение и язвы кожи.



Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., д. 2а.

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Тел.: +375 (17) 299 55 14

Факс: +375 (17) 299 53 58

Телефон отдела фармаконадзора: +375 (17) 242 00 29

Эл. почта: rcpl@rceth.by

<http://www.rceth.by>



5. Хранение препарата Рекреол®

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и тубе после «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Лекарственный препарат не требует специальных условий хранения. Не замораживать.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения**Препарат Рекреол® содержит**

- Действующим веществом является декспантенол.
1 г крема содержит 50 мг декспантенола.
- Вспомогательные вещества: DL-пантолактон; феноксиэтанол; калия цетилфосфат; ланолин (овечий жир); пропиленгликоль; стеариловый спирт; цетиловый спирт; изопропилмиристат; вода очищенная до 1 г.

Внешний вид препарата Рекреол® и содержимое упаковки

Гомогенный белый или белый с желтоватым оттенком крем со специфическим запахом. По 30 г или 50 г в тубе алюминиевой с защитной алюминиевой мембраной на горловине и конусообразным приспособлением для прокола мембраны в навинчивающемся бушоне из пластмассы.

1 туба в пачке картонной вместе с листком-вкладышем.

Отпуск из аптек

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

АО «Гриндекс». Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия

Телефон: +371 67083205

Факс: +371 67083505

Электронная почта: grindeks@grindeks.com

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения в Республике Беларусь:

Представительство АО «Гриндекс»

220030, г. Минск, ул. Энгельса, д. 34А, офис 728

Тел/факс: +375 17 390 2016

office@grindeks.by

Листок-вкладыш пересмотрен: январь 2024 г.

