



**БЕНЗИЛБЕНЗОАТ  
(BENZYL BENZOATE)**

эмульсия для наружного применения 20 %

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА**

*Прочитайте внимательно весь этот листок-вкладыш, прежде чем начать применение препарата!*

*Храните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его.*

*Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.*

*Этот препарат предназначен лично Вам, и не следует передавать его другим лицам. Это может нанести вред их здоровью, даже если симптомы их заболевания схожи с теми, которые наблюдаются у Вас.*

**Общая характеристика:**

**основные физико-химические свойства:** эмульсия белого цвета со слабым специфическим запахом. Допускается расслоение эмульсии, которое устраняется при взбалтывании.

**Состав лекарственного средства:**

*действующее вещество:* 100 г эмульсии содержат бензилбензоата 20 г;

*вспомогательные вещества:* эмульгатор Т-2, мыло зеленое или хозяйственное, шампунь, вода очищенная.

**Лекарственная форма.** Эмульсия для наружного применения.

**Фармакотерапевтическая группа.** Средства, действующие на эктопаразитов, включая чесоточных клещей. Код АТС P03A X01.

Бензилбензоат – средство с педикулезной активностью и акарицидным действием на различные виды клещей, включая чесоточные (*Acarus scabiei*). Проходит сквозь хитиновый покров и накапливается в организме эктопаразитов в токсических концентрациях, вызывая гибель их личинок и взрослых особей; не действует на яйца. Гибель вшей наступает через 2-5 часов, клещей – через 7-32 минуты.

Проникает в верхние слои эпидермиса, не всасывается в системный кровоток.

**Показания.** Педикулез. Чесотка. Демодекоз.

**Противопоказания.** Период беременности или кормления грудью. Детский возраст до 3 лет. Повреждения кожи, в том числе гнойничковые заболевания кожи. Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

**Предостережения при применении.** *Перед применением препарата впервые посоветуйтесь с врачом!* Следует избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки.

При случайном попадании препарата:

- в глаза: тщательно промыть водой или 1 % раствором натрия гидрокарбоната; при раздражении слизистой оболочки глаз закапывают 30 % раствор альбуцида, при боли – 2 % раствор новокаина;
- в рот: рот прополоскать водой или теплым 2 % раствором натрия гидрокарбоната;
- в желудок: при случайном приеме препарата внутрь следует немедленно обратиться к врачу.

После завершения курса лечения необходим врачебный контроль в течение 2 недель (а при наличии осложнений – и более).

Обработка больных в одном очаге, а также контактных лиц должна проводиться одновременно. Осложнения в виде пиодермитов, экземы следует лечить одновременно с чесоткой и продолжать после ее ликвидации.

Перед началом лечения чесотки больному следует принять душ для механического удаления с поверхности кожи клещей, а также для распушивания поверхностного слоя эпидермиса (для облегчения проникновения препарата).

После каждого вынужденного мытья рук их необходимо снова обработать.

Обязательно следует проводить обработку нательного и постельного белья, верхней одежды и головных уборов.

**Применение в период беременности или кормления грудью.** Применение препарата в период беременности противопоказано. В период лечения кормление грудью необходимо прекратить.

**Дети.** Не рекомендуется назначать препарат детям в возрасте до 3 лет. Для применения детям в возрасте от 3 до 5 лет препарат разводят кипяченой водой в соотношении 1:1.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.** Не влияет.

*Если симптомы заболевания не начнут исчезать или же, наоборот, состояние здоровья ухудшилось или появились нежелательные явления, обратитесь к врачу за консультацией относительно дальнейшего использования препарата.*

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Данные отсутствуют.

**Способ применения и дозировка.** Наружно, местно (перед употреблением взбалтывать). Детям в возрасте от 3 до 5 лет препарат разводят кипяченой водой в соотношении 1:1.

**Лечение педикулёза.** Препарат применяют наружно, местно (перед применением препарат необходимо взбалтывать). Эмульсией смочить ватный или марлевый тампон, нанести на волосы головы или волосяные части тела и слегка втереть в кожу. Голову обвязать платком. Через 10 минут обработки при лобковом педикулёзе и через 30 минут при головном педикулёзе смыть препарат проточной водой. При смывании препарата с головы избегать попадания его на кожу лица. После этого платок смочить теплым 5 % раствором уксуса (смешать стакан уксуса с таким же количеством воды, подогретой до 50 °С) и, слегка отжав платок, на 1 час повязать им голову. Гниды при этом отклеиваются от волос. После такой процедуры волосы моют мылом или шампунем, расчесывают густым гребнем, удаляют мертвых вшей и гнид. Эффективность противопедикулёзной обработки определяют через 1 час или через 1 сутки. Если гниды остались, обработку волос проводят снова только 5 % раствором уксуса.

**Лечение чесотки.** Для предотвращения вторичной инвазии необходимо одновременное лечение всех совместно проживающих членов семьи, а также контактных лиц.

Перед применением эмульсии необходимо принять душ. Эмульсию наносят (можно кисточкой) на все тело, за исключением лица и волосистой части головы. Особенно тщательно наносят на запястья, косточки, подмышки, бедра, паховую зону, под ногти, участки между пальцами рук и ног, подошву ног. Дают эмульсии высохнуть (обычно 10 минут в теплой комнате). После высыхания эмульсии надевают чистое белье, меняют постельное белье. Руки после обработки не следует мыть на протяжении 3 часов.

При тщательном нанесении эмульсии обычно достаточно одной обработки кожи. Повторная обработка на протяжении 5 последующих дней снижает вероятность остаточной инвазии.

Альтернативным методом лечения является нанесение эмульсии на все тело, за исключением лица и волосистой части головы, 3 раза с интервалом 12 часов. Через 12 часов после последнего нанесения препарата необходимо принять горячий душ, сменить нательное и постельное белье.

**Лечение демодекоза.** Препарат применяют вечером. Вечером моют лицо теплой водой с мылом, затем препарат наносят тонким слоем на кожу лица. При этом необходимо избегать попадания препарата в глаза, нос и рот. Утром лицо моют теплой водой с мылом. Длительность курса лечения определяется динамикой очищения кожных покровов, купированием воспалительного процесса, прекращением зуда и обычно составляет 2 - 3 недели.

При загустевании эмульсии нужно осторожно разогреть флакон или контейнер в ёмкости с тёплой водой (не выше 40 °С).

**Передозировка.** Возможно усиление побочных эффектов препарата, затрудненное мочеиспускание, контактный дерматит, внезапная потеря сознания, у детей – судороги.

*Лечение:* симптоматическая терапия.

**Побочное действие.** Возможно легкое раздражение кожи, покраснение кожи, ощущение кратковременного жжения, зуд, сухость участка кожи, обрабатываемого препаратом, аллергические реакции.

При развитии выраженных побочных эффектов следует немедленно смыть препарат при помощи мыла.

*В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!*

**Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке.

***Хранить в недоступном для детей месте!***

**Срок годности.** 2 года. *Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.*

**Порядок отпуска.** Без рецепта.

**Упаковка.** По 50 г, 100 г во флаконе или контейнере.

**Название и адрес производителя лекарственного средства.**

ПАО «Луганский химико-фармацевтический завод».

Украина, 91019, г. Луганск, ул. Кирова, 17.

