



ИНСТРУКЦИЯ

(информация для пациентов)

по медицинскому применению лекарственного средства

ХОНДРОАРТ

Торговое название: Хондроарт.

Международное непатентованное название: Не имеет.

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Описание: Мазь от светло-желтого до коричневого цвета со специфическим запахом.

Состав на одну тубу (15 г или 25 г):

активные вещества: хондроитина сульфата – 750 мг или 1250 мг, диклофенака натрия – 750 мг или 1250 мг, диметилсульфоксида – 1500 мг или 2500 мг;

вспомогательные вещества: ланолин, пентол, кислота стеариновая, вода очищенная, вазелин белый.

Фармакотерапевтическая группа: Корректор метаболизма костной и хрящевой ткани. Препарат для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы. Нестероидное противовоспалительное средство для наружного применения.

Код АТС: M02AX10.

Фармакологическое действие

Хондроитин сульфат – высокомолекулярный мукополисахарид, замедляющий резорбцию костной ткани и снижающий потерю кальция. Улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, ускоряет процессы ее восстановления, тормозит процессы дегенерации хрящевой ткани. Способствует восстановлению суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, препятствует сжатию соединительной ткани, выполняет роль смазки суставных поверхностей; нормализует продукцию внутрисуставной жидкости. Уменьшает болезненность и увеличивает подвижность пораженных суставов. Замедляет прогрессирование остеоартроза и остеохондроза. Улучшает качество жизни.

Диклофенак-натрий относится к нестероидным противовоспалительным средствам. Ослабляет боль в состоянии покоя и при движении, утреннюю скованность, припухлость суставов, улучшает их функциональную способность. Быстро облегчает как спонтанную боль, так и боль при движении, уменьшает воспалительный отек.

Диметилсульфоксид, входящий в состав мазевой формы, оказывает противовоспалительное, анальгетическое и фибринолитическое действие, способствует лучшему проникновению активных веществ (хондроитина сульфата и диклофенака) через клеточные мембраны.

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Показания к применению

Дегенеративные заболевания суставов и позвоночника: остеоартроз и остеохондроз.

Способ применения и режим дозирования

Мазь применяют наружно, наносят 2-3 раза в день на область пораженного сустава из расчета 1-2 г на 100-200 см² кожи и мягко втирают до полного впитывания. Столбик мази в 1 см, выдавленный из тубы, соответствует 0,3 г.

Побочное действие

В редких случаях возможны аллергические реакции, гиперемия, зуд.

При возникновении аллергических реакций лечение препаратом следует прекратить, в случае резкого покраснения и зуда следует провести десенсибилизирующую терапию.

Противопоказания

Гиперчувствительность, склонность к кровотечениям, тромбофлебиты, беременность, период лактации.

Передозировка

Явлений передозировки при применении мази не описано.

Особенности применения

Мазь следует наносить на неповрежденные участки кожи.

Следует избегать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки и открытые раны.

Меры предосторожности

При применении мази Хондроарт специальные меры предосторожности не требуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не установлено случаев негативного лекарственного взаимодействия при назначении мази Хондроарт на фоне терапии другими лекарственными средствами, включенными в общепринятые схемы лечения дегенеративных заболеваний суставов и позвоночника.

Условия хранения

Хранить при температуре от 15 °С до 25°С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

По 15 г или 25 г в тубах . Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Отпуск из аптек

Без рецепта.

Производитель:

РУП "Белмедпрепараты",
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
ул. Фабрициуса, 30, т./ф.: (+375 17) 220 37 16,
e-mail: medic@belmedpreparaty.com

