


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ

(информация для пациентов)

по применению лекарственного средства

АЛОЭ ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ

Торговое название: Алоэ экстракт жидкий.

Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Состав: в 1 мл лекарственного средства содержится: *действующего вещества:* алоэ экстракта сухого с пересчётом на окисляемость – 1,5 мг; *вспомогательные вещества:* натрия хлорид, вода для инъекций.

Фармакотерапевтическая группа: Общетонизирующие средства.

Код АТХ-А13А.

Описание: жидкость от светло-желтого до коричневатого-красного цвета со слабым специфическим запахом. В лекарственном средстве допускается наличие взвеси, при хранении выпадающей в осадок, который при встряхивании ампул переходит в равномерную взвесь.

Показания к применению

Офтальмология: применяют в составе комплексной терапии воспалительных заболеваний глаз (блефаритов, конъюнктивитов, кератитов), при помутнении стекловидного тела, миопическом хориоретините, ирите, пигментном ретините, атрофии зрительного нерва, прогрессирующей близорукости.

Гастроэнтерология: в составе комплексной терапии при снижении аппетита, лечении ряда желудочно – кишечных заболеваний вне стадий обострения (гастрита, гастродуоденита, энтероколита, холецистита).

Пульмонология: в составе комплексной терапии бронхиальной астмы, туберкулеза, пневмонии.

Неврология: в составе комплексной терапии невралгии, невритов, радикулоневритов, остаточных явлений после перенесенных полиневритов и инсультов, при снижении слуха и обоняния.

Для лечения рубцовых изменений тканей, трофических язв. При лечении бесплодия (в т.ч. у мужчин).

Противопоказания

Гиперчувствительность, беременность, детский возраст до 1 года, хроническая почечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, метроррагия, геморрой, цистит, острые воспалительные заболевания органов желудочно-кишечного тракта, кровохарканье, холелитиаз.

Способ применения и дозы


Подкожно. Ежедневно по 1 мл (максимальная суточная доза 3 - 4 мл), детям до 5 лет – 0,2-0,3 мл, старше 5 лет – 0,5 мл. Курс 30-50 инъекций, повторные курсы лечения проходят после двух-, трёхмесячного перерыва. При туберкулезных поражениях дыхательных путей начальная доза 0,2 мл с постепенным повышением. При бронхиальной астме вводят в течение 10-15 дней по 1-1,5 мл ежедневно, затем 1 раз в 2 дня; всего на курс 30-35 инъекций.

Передозировка

Не выявлена.

Побочное действие

Аллергические реакции, повышение артериального давления, гипертермия, диарея.



При подкожном введении возможна болезненность в месте инъекции.

В таком случае вводят предварительно 0,5 мл раствора 20 мг/мл новокаина.

Лекарственные взаимодействия

При длительном применении лекарственного средства возможно уменьшение содержания калия в организме, что может способствовать усилению действия сердечных гликозидов и антиаритмических препаратов. При одновременном применении Алоэ экстракта жидкого и тиазидных диуретиков, петлевых диуретиков, лекарственных средств солодки, кортикостероидов повышается риск развития дефицита калия.

Алоэ экстракт жидкий потенцирует действие слабительных средств и лекарственных средств, стимулирующих кроветворение.

Особые указания

В лекарственном средстве допускается наличие взвеси, при хранении выпадающей в осадок, который при встряхивании ампул переходит в равномерную взвесь.

С осторожностью применять лицам пожилого и старческого возраста.

Упаковка

В ампулах по 1 мл в упаковке № 10; № 10 x 1; № 10 x 2.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, г. Борисов Минской обл., ул. Чапаева, 64/27, тел/факс + 375 (177)735612.