



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

ЭЙКОНОЛ

Регистрационный номер:

Торговое название: Эйконол

МНН: -

Химическое название: -

Лекарственная форма: капсулы.

Состав: одна капсула содержит эйконола 450 мг.

Состав оболочки желатиновой капсулы: желатин, глицерин, метилпарагидроксисбензоат Е-218, пропилпарагидроксисбензоат Е-216, вода очищенная.

Описание. Капсулы мягкие желатиновые овальной формы, от светло-желтого до светло-коричневого цвета, прозрачные, упругие, со швом.

Фармакотерапевтическая группа: Лекарственные средства, влияющие на липидный обмен. Омега-3-триглицериды, включая другие эфиры и кислоты.
Код АТХ С10АХ06.

Показания к применению

Основными показаниями к применению препарата являются:

- постинфарктное состояние, а также вторичная профилактика инфаркта миокарда (в составе комбинированной терапии со статинами, антитромботическими средствами, бета-адреноблокаторами, ингибиторами АПФ);
- эндогенная гипертриглицеридемия (тип IV по классификации Фредриксона) в качестве монотерапии в дополнение к диете при ее недостаточной эффективности;
- смешанная гиперлипидемия (тип IIb и III по классификации Фредриксона) в комбинации со статинами;
- снижение риска внезапной смерти у больных ИБС.

Способ применения и дозы

С лечебной целью принимают внутрь по 8-12 капсул в сутки, разделив на 2-3 приема, через 30 мин после еды, запивая водой. Продолжительность лечения устанавливается индивидуально.

С профилактической целью рекомендуется принимать по 2-6 капсул в сутки в течение месяца. Курс повторяют два раза в год.

Не следует превышать рекомендуемую дозировку.

Пациентам с нарушением функции почек коррекции дозы не требуется.

Особые указания

Пациенты, находящиеся на антикоагулянтной терапии, в период приема Эйконола должны находиться под постоянным врачебным наблюдением, при необходимости следует провести соответствующую коррекцию дозы антикоагулянта.

У пациентов с нарушением функции печени необходим регулярный мониторинг функции печени (определение активности АСТ и АЛТ).

При эндогенной гипертриглицеридемии препарат принимается дополнительно к лечебному питанию, только если диетические мероприятия недостаточны для соответствующей реакции. При вторичной эндогенной гипертриглицеридемии (особенно при неподдающемся контролю диабете) опыт применения лекарственного средства ограничен.

С осторожностью назначают при травмах и хирургических операциях (в связи с риском увеличения времени кровотечения), пациентам пожилого возраста (старше 70 лет).

Не рекомендуется применять совместно с поливитаминными комплексами и другим препаратами, содержащими витамины А и D.

В период приема лекарственного средства рекомендуется уменьшить содержание растительного масла в суточном рационе на 10-20 г.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении лекарственного средства с пероральными антикоагулянтами возрастает риск увеличения времени кровотечения.

Назначение препарата совместно с варфарином не приводит к каким-либо геморрагическим осложнениям. Однако в период и после прекращения приема необходим контроль протромбинового времени.

Нет сведений о сочетании с фибратами при лечении гипертриглицеридемии.

Побочное действие

Реакции со стороны пищеварительной системы: рефлюкс или отрыжка с запахом рыбы, тошнота, рвота, метеоризм, изменение вкуса, диарея или запор. У пациентов с гипертриглицеридемией – умеренное повышение активности печеночных трансаминаз.

Дерматологические реакции: редко – экзема, акне.

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: проявление побочных эффектов или усиление их выраженности.

Лечение: симптоматическое, отмена препарата.

Противопоказания

- экзогенная гипертриглицеридемия (гиперхиломикронемия) (тип I по классификации Фредриксона);

- обострение хронического холецистита, панкреатита, заболеваний гепатобилиарной системы;

- желчнокаменная болезнь;

- геморрагический синдром;

- беременность и период лактации;

- детский возраст до 18 лет;

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Влияние на возможность вождения автомобиля, работу с техникой

Не влияет.

Форма выпуска

Мягкие желатиновые капсулы, по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке, по 5 контурных ячейковых упаковок в пачке.

Условия хранения

Хранят в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15°C до 25°C.

Хранят в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпуск производится без рецепта врача.

Название и адрес производителя:

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь,
220075, г. Минск, а/я 112, ул. Инженерная, д. 26
тел./факс (+ 37517) 344-18-66
e-mail: info@mic.by, www.mic.by