



ЛИСТОК – ВКЛАДЫШ по медицинскому применению лекарственного средства **Муравьиный спирт**

Прочитайте внимательно листок-вкладыш перед применением лекарственного средства. Сохраните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться прочитать его заново. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Лекарственная форма: раствор спиртовой для наружного применения

Описание лекарственной формы: прозрачная бесцветная жидкость своеобразного резкого запаха

Состав: 100 г лекарственного средства содержит в качестве действующего вещества 1,4 г муравьиной кислоты.

Вспомогательные вещества: этиловый спирт, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа: средство для местного применения при болях в суставах и мышцах

Показания к применению:

- невралгии, артралгии, миалгии;
- неспецифическиеmono- и полиартриты;
- периартрит.

Способ применения и дозировка

Спирт муравьиный применяют как наружное лекарственное средство для растирания пораженных участков тела. Кратность применения лекарственного средства и длительность курса определяются характером и выраженностью заболевания, характером его базисной фармакотерапии или использованием спирта муравьиного для монотерапии.

Побочное действие

Гиперемия и зуд кожи, аллергические реакции.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к муравьиной кислоте;
- аллергический дерматит;
- экзема;
- воспалительные и инфекционные заболевания кожи, локализованные на участке применения лекарственного средства.

Передозировка

При местном применении случаи передозировки не описаны.

Меры предосторожности

Не следует допускать попадания раствора на слизистые оболочки, так как спирт, который содержится в препарате, может вызывать ожоги, сильное раздражение. В случае попадания спирта муравьиного на слизистые оболочки необходимо промыть их проточной водой и немедленно обратиться к врачу.

Применение в детском возрасте

Нет данных об опыте применения лекарственного средства Муравьиный спирт, раствор спиртовой для наружного применения, в детском возрасте.

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения

Муравьиный спирт,

Применение при беременности и лактации

Эффективность и безопасность применения лекарственного средства Муравьиный спирт, раствор спиртовой для наружного применения, при беременности и лактации не изучалась.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимого взаимодействия муравьиной кислоты с другими лекарственными средствами не известно. При одновременном применении с препаратами для наружного применения, которые содержат органические соединения, могут образоваться новые соединения, может наблюдаться денатурация белковых компонентов.

Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами

Не влияет.

Условия хранения

В защищённом от света месте при температуре не выше +25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Лекарственное средство нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Лекарственное средство отпускается без рецепта врача.

Форма выпуска

По 60 мл и 100 мл во флаконах, помещённых вместе с листком-вкладышем для потребителя в пачки из картона.

Производитель: ООО «Фармтехнология», 220024 г. Минск, ул. Корженевского, 22.

телефон: (017) 278 03 53, тел./факс: (017) 212 12 59.