


# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

по медицинскому применению лекарственного средства  
(информация для пациента)

### Эстифан

**Торговое название:** Эстифан.

**Лекарственная форма:** таблетки.

**Состав:** каждая таблетка содержит: *действующее вещество* – сухой экстракт эхинацеи - 200 мг; вспомогательные вещества – лактозы моногидрат, крахмал картофельный, метилцеллюлоза, кальция стеарат.

**Описание:** Таблетки от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, с вкраплениями, круглые, двояковыпуклой формы.

**Фармакотерапевтическая группа:** прочие иммуностимуляторы.

**АТХ код:** L03AX.

#### Показания к применению

Кратковременная профилактика и лечение в составе комплексной терапии острых респираторных заболеваний.

#### Способ применения и дозы

Внутрь, после еды по 1–2 таблетки 3 раза в день.

В фазе обострения заболевания эстифан назначают в комплексе с антибактериальной терапией по 2 таблетки 3 раза в день в течение 5 дней, затем по 1 таблетке 3 раза в день.

Для профилактики и лечения простудных заболеваний препарат не следует использовать более 10 дней. При лечении простудных заболеваний следует начинать прием препарата при первых признаках заболевания. *Если симптомы заболевания сохраняются более 10 дней необходимо проконсультироваться с врачом.*

## **Применение у детей**

Прием лекарственного средства детям в возрасте до 12 лет не рекомендован, так как не была подтверждена эффективность, хотя данные о специфическом риске для детей в возрасте старше 1 года отсутствуют.

### **Побочное действие**

У пациентов с повышенной чувствительностью могут развиваться аллергические реакции (сыпь, крапивница, синдром Стивенса-Джонсона, отек Квинке, приступ бронхоспазма, анафилактический шок).

Эхинацея может вызвать развитие аллергических реакций у пациентов с атопией.

Были сообщения о связи приема эхинацеи с развитием аутоиммунных заболеваний (рассеянный энцефалит, узловатая эритема, тромбоцитопения иммунного характера, синдром Эванса, синдром Шегрена с дисфункцией почечных канальцев).

При приеме более 8 недель может развиваться лейкопения. *В случае развития побочных реакций необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.*

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность (в т.ч. к растениям семейства сложноцветных), прогрессирующие системные заболевания: туберкулез, лейкоз, системные заболевания соединительной ткани, рассеянный склероз, СПИД, ВИЧ-инфекция, аутоиммунные заболевания, состояние иммунодефицита, иммуносупрессии, патология системы лейкоцитов. Детский возраст до 12 лет.

### **Передозировка**

*Симптомы:* тошнота, рвота, диарея, повышенная возбудимость, бессонница, снижение артериального давления.

*Лечение:* адекватная симптоматическая и поддерживающая терапия.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Исследования по изучению взаимодействия эхинацеи пурпурной с другими лекарственными средствами не проводились. Однако не рекомендуется применять эхинацею в период приема иммуносупрессивных средств (например, цик-

лоспорин и метотрексат). *Перед совместным приемом с другими лекарственными средствами пациент должен проконсультироваться с врачом.*

### **Меры предосторожности**

Если во время приема препарата происходит ухудшение состояния или поднимается температура, необходимо обратиться к врачу. Пациентам с атопией в связи с риском развития анафилактических реакций перед приемом препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

В связи с содержанием в лекарственном средстве лактозы Эстифан не следует принимать при врожденной непереносимости лактозы, дефиците лактазы или глюкозо-галактозной мальабсорбции.

### *Применение во время беременности и лактации*

В связи с отсутствием достаточных данных применение препарата во время беременности и кормления грудью не рекомендовано.

*Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами*

Исследования по оценке влияния препарата на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

### **Упаковка**

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке, по 1 или 3 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

### **Условия хранения**

В защищенном от света и влаги месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года. Не применять после истечения срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

### **Название и адрес изготовителя**

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64/27, тел/факс + 375 (177) 735612.