


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ИНСТРУКЦИЯ (информация для пациентов) по медицинскому применению лекарственного средства **НОГОТКОВ ЦВЕТКИ**

Торговое название: Ноготков цветки.

Международное непатентованное название: -.

Описание: Цельные или частично осыпавшиеся цветочные корзинки диаметром до 5 см, без цветоносов или с остатками их не длиннее 3 см. Цвет краевых цветков красновато-оранжевый, оранжевый, ярко- или бледно-желтый; срединных – оранжевый, желтовато-коричневый или желтый. Запах слабый. Вкус солоновато-горький.

Состав: Ноготков цветки - 50 г или 100 г.

Лекарственная форма: Цельное растительное сырье для приготовления настоя.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие антисептические средства, применяемые для лечения заболеваний горла.

Код АТС: R02AA20.

Фармакологические свойства

Настой цветков ноготков обладает противовоспалительным, антисептическим, ранозаживляющим действием, ускоряет процессы регенерации тканей.

Показания к применению

Местно: ангины, тонзиллиты, воспалительные заболевания полости рта (гингивиты, пиорея, воспалительно-дистрофическая форма пародонтоза).

Наружно: гнойные раны, язвы, ожоги.

Способ применения и дозы

Применяют местно для полосканий полости рта и глотки по 1/2-1 стакану настоя (в теплом виде) 3-5 раз в день.

При ожогах и гнойных ранах настой цветков ноготков применяют наружно в виде примочек.

Для приготовления настоя 10 г (4 столовые ложки) цветков помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин при частом помешивании, охлаждают при комнатной температуре в течение 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции при повышенной индивидуальной чувствительности. В случае их возникновения следует прекратить применение настоя и обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препаратам ноготков, полосканий полости рта и глотки), детский возраст до 6 лет (для при заболеваниях кожи). Беременность, период лактации.

СОГЛАСОВАНО Детский возраст до 12 лет (для

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Приложение Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

Передозировка

Не наблюдалась.

Меры предосторожности

Применение у детей. При гнойно-воспалительных заболеваниях кожи может применяться у детей старше 6 лет. Для полосканий при воспалительных заболеваниях полости рта, ангинах, тонзиллитах может назначаться детям старше 12 лет.

Применение во время беременности и в период лактации. Противопоказано.

Влияние на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами. Не влияет на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Условия хранения

Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15°C до 25°C.

Приготовленный настой хранить при температуре от 8°C до 15°C не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

По 50 г или 100 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным.

Отпуск из аптек

Без рецепта врача.

Производитель:

РУП "Белмедпрепараты",

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, т./ф.: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com

