

02.08.2013
Григорьев


Листок-вкладыш
(информация для пациента)

БРУСНИКИ ЛИСТЬЯ

длее № 10 от 28.10.2013

МНН. Отсутствует.

Регистрационный номер: _____



Брусники листья содержат фенологликозиды (арбутин, метиларбутин, пиразид и др.), флавоноиды (авикулярин, гиперозид, кверцитрин, изокверцитрин, рутин и др.), дубильные вещества конденсированной группы, тритерпеноиды (урсоловую кислоту, олеаноловую кислоту).

Состав. Брусники листья, измельченное сырье.

Форма выпуска. Измельченное сырье 50 г и 100 г в пачках.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие средства, используемые для лечения урологических заболеваний.

Показания к применению. Внутрь: в комплексной терапии заболеваний мочевыводящих путей (цистит, уретрит) после консультации врача.

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к веществам, содержащимся в лекарственном средстве, заболевания почек (гломерулонефрит), почечная недостаточность, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозировка. 6 г (2 столовые ложки) листьев помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водянной бане) 30 мин и сразу процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл. Взрослые принимают внутрь в теплом виде по 1/3-1/2 стакана, дети старше 12 лет – от 1 столовой ложки до 1/4 стакана 2-3 раза в день через 30 минут после еды. Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Побочное действие. Аллергические реакции, тошнота, рвота. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка. Прием высоких доз может вызвать тошноту и рвоту. При длительном применении возможно обострение воспалительного процесса в почках и мочевыводящих путях. В связи с гепатотоксическим действием гидрохинона возможно нарушение функции печени.

Меры предосторожности. Лекарственное средство противопоказано для приема во время беременности и лактации, а также детям до 12 лет. Прием детьми в возрасте 12-18 лет возможен только после консультации врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Не применять одновременно с продуктами питания (рыба, мучные изделия, мясные блюда) и лекарственными средствами (аммония хлорид, метионина гидрохлорид и др.), вызывающими подкисление мочи.

Особенности применения. Принимают внутрь в теплом виде. Не рекомендовано назначать пациентам с кислой реакцией мочи. Если во время лечения симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, появляются расстройства мочеиспускания, боли спастического характера, кровь в моче), необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Влияние на возможность вождения автомобиля и работу с техникой. Информация отсутствует.

Условия и срок хранения. Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный отвар – при температуре от 8 °C до 15 °C не более 2 суток.

Срок годности – 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска. Без рецепта врача.

Упаковка. По 50 г или 100 г в пачке картонной с внутренним бумажным пакетом.

Производитель. ООО «Калина».

Адрес. Республика Беларусь
211019, Витебская область,
Оршанский район,
д. Пищалово
Телефон. (0216) 27-81-68

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь