


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



№ N 12 от 29.09.14

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ (ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА)

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ Э

Общая характеристика.

Международное название. Medicinal charcoal.

Описание. Таблетки плоскоцилиндрические с риской и фаской, черного цвета, слегка шероховатые.

Состав. Каждая таблетка содержит угля активированного 250 мг; вспомогательные вещества: крахмал картофельный.

Лекарственная форма. Таблетки.

Фармакотерапевтическая группа. Кишечные адсорбенты. Активированный уголь.

Код АТС А07ВА01.

Показания к применению. Диспепсия, пищевые интоксикации, отравления алкалоидами, гликозидами, солями тяжелых металлов. Назначают при метеоризме для уменьшения газообразования, при подготовке к рентгенологическим и эндоскопическим исследованиям.

Способ применения и дозы. Внутрь в таблетках или после предварительного измельчения в виде водной взвеси (необходимое количество лекарственного средства размешивают в ½ стакана воды), за 1-2 ч до или после еды и приема других лекарственных средств.

Взрослые: обычная доза составляет 3-6 таблеток 3-4 раза в сутки; максимальная разовая доза – 8 г.

Дети: обычная доза составляет 2-4 таблетки 3-4 раза в сутки; в случае диареи дозу увеличивают до 4-5 таблеток 3-4 раза в сутки. При различных отравлениях детям от 3 до 7 лет назначают внутрь в дозе 5 г 3 раза в сутки, детям от 7 до 14 лет назначают внутрь в дозе 7 г 3 раза в сутки. Детям УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ Э всегда назначают в виде суспензии измельченных таблеток в небольшом количестве воды, после приема которой необходимо выпить стакан воды.

Курс лечения при острых заболеваниях составляет 3-5 дней, при хронических заболеваниях, обусловленных эндогенными интоксикациями – 10-15 дней. При необходимости, по рекомендации врача, возможен повторный курс через 2 недели.

При диспепсии, метеоризме – по 1-2 г 3-4 раза в сутки. Курс лечения 3-7 дней.

При острых отравлениях лечение начинают с промывания желудка с использованием взвеси активированного угля, затем назначают внутрь в дозе 20-30 г на прием в виде водной взвеси в 0,5-2 стаканах воды.

Побочное действие. Возможны проявления повышенной чувствительности; диспептические явления (запоры, поносы, тошнота, рвота), которые устраняются отменой лекарственного средства и назначением симптоматической терапии.

При длительном применении – обеднение организма витаминами, микроэлементами, жирами, белками, что требует соответственной врачебной или алиментарной коррекции.

В случае появления любых нежелательных явлений больному необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания. Язвенные поражения пищеварительного тракта, желудочные кровотечения, атония кишечника, индивидуальная непереносимость лекарственного средства, детский возраст до 3 лет.

Передозировка. Значительное превышение максимальных разовых доз (такие дозы применяются в случае острого отравления) может приводить к развитию тошноты, рвоты, запоров, непроходимости кишечника. Данные симптомы исчезают после уменьшения дозы или отмены лекарственного средства.

Возникновение механической непроходимости можно предотвратить назначением слабительных.

Меры предосторожности. При лечении интоксикаций необходимо создать избыток угля в желудке (до его промывания) и в кишечнике (после промывания желудка). Уменьшение концентрации угля в среде способствует десорбции связанного вещества и его всасыванию (для предупреждения резорбции освободившегося вещества рекомендуется повторное промывание желудка и назначение угля).

Наличие пищевых масс в желудочно-кишечном тракте требует введения активированного угля в более высоких дозах, т. к. содержимое желудочно-кишечного тракта сорбируется углем и его активность снижается.

Если отравление вызвано веществами, участвующими в энтерогепатической циркуляции (сердечные гликозиды, индометацин, морфин и др. опиаты), необходимо применять уголь в течение нескольких дней.

Пожилым людям и детям активированный уголь рекомендуется назначать вместе с раствором электролитов с глюкозой.

При отравлении кислотами и щелочами активированный уголь не назначают.

Окрашивает каловые массы в черный цвет.

Рекомендуется хранить в сухом месте, отдельно от веществ, выделяющих в атмосферу газы или пары. Хранение на воздухе (особенно влажном) снижает сорбционную способность.

Беременность и лактация. Не противопоказан во время беременности и лактации.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Не влияет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. В связи с адсорбционными свойствами угля активированный может уменьшать эффективность одновременно принимаемых лекарственных средств, особенно активность лекарственных средств, действующих в области желудка.

Условия хранения и срок годности. Хранить в защищенном от влаги месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска. Без рецепта.

Упаковка. По 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНИЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Информация о производителе.

Произведено и расфасовано:

ОАО «Ирбитский химфармзавод», Россия,
623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, 172.

Упаковано:

ОАО «Экзон», Республика Беларусь,
225612, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, 202.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ОДРАЗКОУВАННЯ
РЕСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Прыказ Міністэрства ад 16
Республики Беларусь