

19 10. 2015 1040
КЛС № 9 от 01.10.2015

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

ЧЕРНИКА-МИК

Торговое название: Черника-МИК

Лекарственная форма: капсулы

Состав: одна капсула содержит антоцианидинов - 44,25 мг (в виде черники экстракта сухого стандартизованного (25% антоцианидинов)).

Вспомогательные вещества – лецитин, воск пчелиный, подсолнечное масло.

Состав оболочки капсулы: желатин, глицерин, титана диоксид, вода очищенная, натрия бензоат, бриллиантовый голубой Е-133, железа оксид черный Е-172, кармуазин Е-122.

Описание. Капсулы мягкие желатиновые овальной формы со швом, упругие, темно-фиолетового цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие средства, применяемые в офтальмологии.

Код АТС S01XA.

Показания к применению

Лекарственное средство Черника-МИК показано как средство неспецифической антиоксидантной терапии для профилактики и комплексного лечения:

- диабетической ретинопатии, гипертонической ретинопатии;
- для профилактики – при ухудшении зрения при высокой зрительной нагрузке, работе с компьютером, зрительного утомления.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым по 1-3 капсулы 3 раза в сутки.

Рекомендуемая суточная доза может составлять 160-400 мг. Максимальная суточная доза 540 мг.

Режим дозирования, суточная доза и длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Информация об особенностях дозирования у пациентов с нарушениями функции печени и/или почек, пациентов пожилого возраста отсутствует.

Особые указания

Если симптомы сохраняются на фоне приема лекарственного средства или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции к компонентам лекарственного средства.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данном листке-вкладыше, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Применение во время беременности и кормления грудью

В связи с отсутствием достаточных данных принимать женщинам во время беременности и лактации не рекомендуется.

Применение у детей

В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей до 18 лет не рекомендуется.

Передозировка

О случаях передозировки лекарственного средства не сообщалось.

Противопоказания

Противопоказанием к применению лекарственного средства является повышенная чувствительность к его компонентам, беременность и лактация. См. раздел «Особые указания».

Влияние на возможность вождения автомобиля, работу с техникой

Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

Форма выпуска

Капсулы мягкие желатиновые овальной формы со швом, упругие, темно-фиолетового цвета, по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке, по 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачке.

Условия хранения

Хранят в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранят в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпуск производится без рецепта врача.

Название и адрес производителя:

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь,
220075, г. Минск, а/я 112, ул. Инженерная, д. 26
тел./факс (+ 37517) 344-18-66
e-mail: info@mic.by, www.mic.by