


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



КАЕ N 10 от 02.11.15

ИНСТРУКЦИЯ

(информация для пациентов)

по медицинскому применению лекарственного средства

ИНОКАРДИН

Торговое название: Инокардин.

Международное непатентованное название: нет.

Описание: смесь порошка и гранул белого или слегка желтоватого цвета.

Состав: каждый пакет содержит:

активные вещества: L-аргинина сукцината (в пересчете на 100% вещество) – 1000,0 мг, инозина (в пересчете на 100% вещество) – 300,0 мг;

вспомогательные вещества: макрогол 4000, ароматизатор «Лимон РХ1548», лимонной кислоты моногидрат, аспартам, сорбитол.

Лекарственная форма: порошок для приготовления раствора для внутреннего применения.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие препараты для лечения заболеваний сердца.

Код АТХ: C01EB.

Фармакологическое действие

Инокардин – комбинированное метаболическое лекарственное средство, действие которого обусловлено свойствами входящих в комбинацию ингредиентов. Инозин – нуклеозид пурина, предшественник аденозинтрифосфата; проникающий в клетки, оказывает антигипоксическое, метаболическое и антиаритмическое действие. Улучшает коронарное кровообращение и энергетический метаболизм миокарда в условиях гипоксии. Увеличивает силу сокращений сердца и способствует более полному расслаблению миокарда в диастоле, повышает ударный объем крови. L-аргинин – одна из 20 естественных аминокислот. Помимо участия в белковом синтезе, является источником образования NO и других ключевых метаболитов (мочевины, орнитина, агматина, креатинина, полиаминов, глутамата). Играет важную роль в клеточном делении, регенерации тканей, иммунных функциях, секреции гормонов, детоксикации аммиака. Снижает артериальное давление, позитивно действует при эндотелиальной дисфункции и оказывает кардиозащитный эффект при ишемическо-реперфузионном повреждении миокарда.

Показания к применению

ИБС, стенокардия, ишемическая кардиомиопатия (в составе комплексной терапии).

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды. Содержимое пакета растворяют в 100 мл свежeproкипяченной и охлажденной до комнатной температуры питьевой воды. Лекарственное средство

принимают 1-2 раза в сутки. Средняя продолжительность лечения – 21 день.
Приготовленный раствор хранению не подлежит.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции в виде крапивницы, кожного зуда, гиперемии кожи (требуется отмена лекарственного средства). Редко при лечении лекарственным средством отмечаются повышение концентрации мочевой кислоты и обострение подагры (при длительном применении).

Противопоказания

Гиперчувствительность, постинфарктный период, подагра, гиперурикемия, беременность, период лактации, период активного проявления заболевания вирусом простого герпеса, шизофрения, детский возраст до 18 лет.

Передозировка

При использовании в рекомендуемых дозах как острое, так и хроническое отравление маловероятно.

Особенности применения

С осторожностью назначают при нарушениях функции почек. Инокардин не применяется для экстренной коррекции нарушений деятельности сердца.

Применение во время беременности и в период лактации. Применение лекарственного средства во время беременности и в период лактации противопоказано.

Меры предосторожности

Влияние на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами. Противопоказаний нет.

Условия хранения

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не использовать после окончания срока годности.

Упаковка

По 3500 мг в пакеты из материала комбинированного на бумажной и картонной основе.

По 10 пакетов вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Отпуск из аптек

Без рецепта.

Производитель:

РУП "Белмедпрепараты",
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
ул. Фабрициуса, 30, т./ф.: (+375 17) 220 37 16,
e-mail: medic@belmedpreparaty.com

