

Листок-вкладыш (информация для пациента)

ТРАВИСИЛ
TRAVISIL

Название лекарственного средства: Трависил

Общая характеристика. Описание.

Таблетки с ароматом и вкусом меда: круглые таблетки от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, с гравировкой «*T*» на обеих сторонах, с характерным ароматом меда. Таблетки имеют шероховатую поверхность. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе, незначительная неровность краев и мелких сколов. Возможно появление белого налета (опудривания) или легкое прилипание таблеток к внутренней стороне первичной упаковки.

Таблетки с ароматом и вкусом лимона: круглые таблетки от светло-желтого до темно-желтого с коричневатым оттенком цвета, с гравировкой «*T*» на обеих сторонах, с характерным лимонным ароматом. Таблетки имеют шероховатую поверхность. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе, незначительная неровность краев и мелких сколов. Возможно появление белого налета (опудривания) или легкое прилипание таблеток к внутренней стороне первичной упаковки.

Таблетки с ароматом и вкусом мяты: круглые таблетки от светло-зеленого до темно-зеленого с коричневатым оттенком цвета, с гравировкой «*T*» на обеих сторонах, с характерным мятным ароматом. Таблетки имеют шероховатую поверхность. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе, незначительная неровность краев и мелких сколов. Возможно появление белого налета (опудривания) или легкое прилипание таблеток к внутренней стороне первичной упаковки.

Таблетки с ароматом и вкусом апельсина: круглые таблетки от светло-оранжевого до темно-оранжевого с коричневатым оттенком цвета, с гравировкой «*T*» на обеих сторонах, с характерным апельсиновым ароматом. Таблетки имеют шероховатую поверхность. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе, незначительная неровность краев и мелких сколов. Возможно появление белого налета (опудривания) или легкое прилипание таблеток к внутренней стороне первичной упаковки.

Состав:

Каждая таблетка содержит:

Юстиции адатоды листьев экстракт сухой, 20:1 (<i>Justicia adhatoda</i> , сем. Акантовых-Acanthaceae)	5 мг
Перца длинного плодов экстракт сухой, 20:1 (<i>Piper longum</i> , сем. Перцевых - <i>Piperaceae</i>)	25 мг
Перца черного плодов экстракт сухой, 20:1 (<i>Piper nigrum</i> сем. Перцевых- <i>Piperaceae</i>)	20 мг
Имбиря лекарственного корневищ экстракт сухой, 20:1 (<i>Zingiber officinale</i> , сем. Имбирных - <i>Zingiberaceae</i>)	12 мг
Солодки голой корней экстракт сухой, 20:1	10 мг

(Glycyrrhiza glabra L., сем. Бобовых - Fabaceae)	
Эмблики лекарственной плодов экстракт сухой, 20:1	16 мг
(Emblica officinalis, сем. Молочайных - Euphorbiaceae)	
Куркумы длинной корневищ экстракт сухой, 20:1	15 мг
(Curcuma longa, сем. Имбирных - Zingiberaceae)	
Акации катеху коры экстракт сухой, 20:1	17 мг
(Acacia catechu, сем Мимозовых - Mimosoideae)	
Фенхеля обыкновенного плодов экстракт сухой, 20:1	18 мг
(Foeniculum vulgare, сем. Зонтичных - Apiaceae)	
Базилика священного листьев, корней, семян экстракт сухой, 20:1	5 мг
(Ocimum sanctum L., сем. Губоцветные - Labiateae)	
Терминалии чебулы плодов экстракт сухой, 20:1	5 мг
(Terminalia chebula, сем. Комбретовых - Combretaceae)	
Терминалии беллерика плодов экстракт сухой, 20:1	5 мг
(Terminalia belerica, сем. Комбретовых - Combretaceae)	
Альпинии лекарственной корневищ экстракт сухой, 20:1	20 мг
(Alpinia officinarum, сем. Имбирных - Zingiberaceae)	
Абруса молитвенного листьев экстракт сухой, 20:1	20 мг
(Abrus precatorius, сем. Бобовых - Fabaceae)	
Ментол	2 мг

Вспомогательные вещества

Сахароза, жидкая глюкоза, Трависил таблетки для рассасывания с ароматом и вкусом апельсина – масло апельсина; Трависил таблетки для рассасывания с ароматом и вкусом мяты – мяное масло; Трависил таблетки для рассасывания с ароматом и вкусом лимона – масло лимона; Трависил таблетки для рассасывания с ароматом и вкусом мёда – ароматизатор мёда.

Форма выпуска. Таблетки для рассасывания.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства в комбинации.

Код ATХ: R05CA10.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика:

Трависил (таблетки для рассасывания) являются аюрведическим средством. Оказывает противовоспалительное, отхаркивающее и муколитическое действие. Традиционно используется для симптоматического лечения заболеваний органов дыхания, сопровождающихся кашлем.

Фармакокинетика:

Механизм действия не установлен. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических и фармакокинетических параметров аюрведических средств невозможно.

Показания к применению.

В качестве симптоматического средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем.

Способ применения и дозировка.

Таблетки рассасываются в полости рта.


Взрослым – по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Курс лечения до 2 недель.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Пациенты с нарушением функции почек и/или печени. Лекарственное средство не рекомендовано пациентам с нарушением функции почек и/или печени тяжелой степени.

Применение у детей. Безопасность и эффективность применения лекарственного средства Трависил таблетки для рассасывания у детей до 18 лет не установлены. Ввиду недостатка данных не рекомендовано принимать препарат детям и подросткам до 18 лет.



Побочные реакции.

Возможны аллергические реакции.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания:

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 18 лет.

Передозировка.

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Трависил таблетки не сообщалось.

Меры предосторожности.

Таблетки содержат сахарозу, что необходимо учитывать пациентам, страдающим сахарным диабетом, а также при гипокалорийной диете.

В связи с содержанием в препарате вспомогательных компонентов сахарозы и глюкозы, препарат не рекомендуется применять пациентам, страдающим сахарным диабетом, а также пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией, сахаразно-изомальтазной недостаточностью. Таблетки для рассасывания при длительном применении (от 2-х недель и более) могут вызывать повреждение зубов.

С осторожностью применять у пациентов с повышенным риском кровотечений, желчнокаменной болезнью, холангитом, заболеваниями почек и/или печени, артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипокалиемией.

Если во время приема лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния (развитие нарушения дыхания, повышается температура, появляется кашель с гнойной мокротой), необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не рекомендуется одновременный приём с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты.

Применение при беременности и кормлении грудью.

Препарат не рекомендуется применять при беременности и в период лактации в связи с отсутствием клинических данных.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с опасными механизмами.

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения и срок годности.

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 5 лет. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска.

Без рецепта врача.

Упаковка. По 8 таблеток в блистере из ПВХ/алюминия. По 2 блистера в пачке из картона коробочного вместе с листком-вкладышем.

Информация о производителях.

Произведено и расфасовано.

Плетхиго Фармасьютикалз Лтд., Индия

Дхаравара, Калария – 453001, Индор (М.П.) Индия.

Упаковано.

ОАО «Экзон», Республика Беларусь,
225612, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, 202.

