


**Инструкция
по медицинскому применению лекарственного средства
(информация для пациентов)**

ЭНТЕРОСПОР



Торговое название

Энтероспор

Международное непатентованное название

Отсутствует

Форма выпуска

Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения

Состав

Один пакет содержит:

активное вещество: споры *Vacillus clausii* – 2 миллиарда;

вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, диоксид кремния коллоидный.

Описание

Порошок от почти белого до светло-коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Антидиарейные микроорганизмы.

Код АТС: A07FA

Показания для применения

Лечение и профилактика кишечного дисбактериоза (дисмикробиоза) и последующего эндогенного дисвитаминоза.

Лечение по восстановлению кишечной микробной флоры, измененной в ходе лечения антибиотиками или другими химиотерапевтическими средствами.

Острые и хронические желудочно-кишечные расстройства у детей, характерные для интоксикации или кишечного дисбактериоза (дисмикробиоза) и дисвитаминоза.

Способы применения и дозировка

Применяется в виде раствора для внутреннего применения. Содержимое пакета следует принимать, растворив в 20-50 мл воды.

Детям от 6 до 12 лет: по 1 пакету 1 или 2 раза в день.

Детям старше 12 лет и взрослым: по 1 пакету 2 или 3 раза в день.

Продолжительность лечения определяется индивидуально врачом и составляет от 6 до 14 дней. Недопустимо растворение препарата в сильно горячей или холодной воде и хранение его в растворенном виде.

Побочное действие

Имеются сообщения об аллергических реакциях, таких, как сыпь и крапивница, полученных в ходе применения лекарственного средства.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или какому-либо из ингредиентов лекарственного средства.

Передозировка

На настоящий момент клинических проявлений передозировки не зарегистрировано.

Меры предосторожности

Во время антибиотической терапии лекарственное средство следует принимать в перерывах между приемами антибиотиков.

Препарат содержит лактозу. У пациентов с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактозы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией применение лекарственного средства не рекомендуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Лекарственные взаимодействия в результате одновременного приема с другими лекарственными средствами не известны.

Применение в период беременности и лактации

Прием данного лекарственного средства не противопоказан во время беременности и грудного вскармливания.

Влияние на способность управлять автомобилем и работу с движущимися механизмами

Лекарственное средство не влияет на способности, необходимые для управления транспортными средствами или другими механизмами.

Упаковка

По 1000 мг порошка в пакет из пленки полимерной или материала комбинированного.
По 20 пакетов вместе с листком-вкладышем упаковывают в картонную коробку.

Условия хранения

Хранить оригинальной упаковке в защищенном от влаги месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Препарат не должен применяться по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Производитель

ООО «БЕЛАЛЕК», Республика Беларусь
222163 г. Жодино, ул. Советская, 9
тел./факс: +375172087644
e-mail: belalek@tut.by