

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

## ИНСТРУКЦИЯ (информация для пациентов) по применению лекарственного средства **Фитотуссин капсулы плюща**

Торговое название: Фитотуссин капсулы плюща

19.07.2016 674

Международное непатентованное название: Hederae helicis folium

### Описание:

Твердые желатиновые капсулы цилиндрической формы с полусферическими концами темно-зеленого цвета. Содержимое капсул – порошок от светло-коричневого до коричневого цвета. Допускается наличие частиц в виде уплотненной порошкообразной массы.

### Состав: 1 капсула содержит:

Активное вещество: плюща обыкновенного листьев экстракт сухой 15 % - 26,0 мг, соотношение лекарственного растительного сырья/экстракт: 6-8/1, экстрагент – этанол: вода (30:70, об/об) или плюща обыкновенного листьев экстракт сухой – 26,0 мг, соотношение лекарственного растительного сырья/экстракт: 4/1, экстрагент – этанол: вода (30:70, об/об)

Вспомогательные вещества: магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, целлюлоза микрокристаллическая, лактоза моногидрат.

### Состав желатиновой капсулы №1:

Желатин, вода очищенная, титана диоксид Е-171, патентованный голубой V Е-131, хинолиновый желтый Е-104, азорубин (кармуазин) Е-122, бриллиантовый черный РН Е-151.

Форма выпуска: капсулы

Фармакотерапевтическая группа: Отхаркивающие средства.

Код ATX: R05CA12

### Фармакологические свойства

Действующим веществом лекарственного средства является сухой экстракт листьев плюща.

Отхаркивающее действие предположительно обусловлено раздражением слизистой оболочки желудка, при котором секреторные бронхиальные железы слизистой оболочки бронхов рефлекторно стимулируются чувствительными волокнами парасимпатической системы.

### Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся кашлем.

### Способ применения и дозы

Детям от 6 до 12 лет – по 1 капсуле 2 раза в день.

Взрослым и детям старше 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в день.

Препарат принимают вне зависимости от приема пищи и запивают достаточным количеством теплой воды или чая.

Продолжительность курса лечения составляет 5-7 дней.

Если симптомы сохраняются в течение недели после приема, следует проконсультироваться с врачом.

### **Побочное действие**

Указанную ниже частоту нежелательных реакций определяли, используя следующее примечание: очень часто (> 1/10), часто (> 1/100 - < 1/10), нечасто (> 1/1000 - < 1/100), редко (> 1/10000 - < 1/1000), очень редко (< 1/10000), неизвестно (нельзя определить на основании имеющихся данных).

Со стороны иммунной системы: нечасто – аллергические реакции (крапивница, кожная сыпь, купероз (телеангиэктазия), одышка).

Со стороны пищеварительной системы: часто – тошнота, рвота, диарея.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

### **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- гиперчувствительность к растениям семейства Аралиевых;
- детский возраст до 6 лет.

### **Передозировка**

Не следует превышать рекомендованные дозы.

Прием препарата в больших количествах, превышающих трехкратную суточную дозу, может вызвать тошноту, рвоту, диарею и возбуждение.

Лечение: симптоматическая терапия.

### **Особые указания**

Лекарственное средство не следует принимать пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка.

В связи с содержанием лактозы лекарственное средство не рекомендуется пациентам с врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или мальабсорбицией глюкозы-галактозы.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или в случае ухудшения состояния (возникновение одышки, повышение температуры, появление мокроты с примесью гноя или крови), следует незамедлительно проконсультироваться с врачом.

### **Применение у детей**

В связи с особенностями лекарственной формы лекарственное средство противопоказано детям до 6 лет.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не рекомендовано одновременное применение с противокашлевыми лекарственными средствами, такими как кодеин и дексетрометорфен, так как это затрудняет откашивание разжиженной мокроты.

### **Применение во время беременности и лактации**

Безопасность применения в период беременности и кормления грудью не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных, прием препарата во время беременности и лактации не рекомендуется.

## **Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами**

Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

### **Условия хранения**

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Упаковка**

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 2 или по 3 контурных упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

### **Отпуск из аптек**

Без рецепта врача.

### **Производитель**

Иностранные производственное унитарное предприятие «Мед-интерпласт», 222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Ленинская, 115, каб. 204.