

19.12.2016
Ли

Листок-вкладыш для пациента

для лекарственного средства


АКОРДИЛУМ

Гомеопатическое лекарственное средство. Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

Регистрационный номер

Наименование

АКОРДИЛУМ



Лекарственная форма

Капли для приема внутрь

Описание

Раствор коричневого цвета специфического запаха и вкуса.

Состав

В 1 г(1,05 мл) раствора содержится:

Горицвет весенний D5 0,01 г,

Кактус крупноцветковый D4 0,01 г,

Натриево-хлористое золото C6 0,001 г,

Боярышник слаженный Ø 0,01 г,

Карбонат калия C3 0,001 г,

Нитроглицерин C5 0,001 г.

Готовое лекарственное средство содержит не менее 25%(об/об) этилового спирта.

В 1 мл лекарственного средства АКОРДИЛУМ содержится 39 капель.

Вспомогательные вещества: спирт этиловый 96%, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие лекарственные средства. Гомеопатическое лекарственное средство.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

АКОРДИЛУМ представляет собой гомеопатическое лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.



Фармакокинетика

Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется в комплексной терапии пациентов с функциональными нарушениями сердечной деятельности.

Способ применения и дозы

Детям и подросткам от 12 до 18 лет по 4 капли 3 раза в день.

Взрослым - по 10 капель 3 раза в день.

Лицам пожилого возраста по 8 капель 3 раза в день.

Раствор принимать за 0,5-1 час до еды. Перед приемом гомеопатическое средство следует развести в небольшом количестве воды (1 чайная ложка).

Длительность курса лечения

Продолжительность приема гомеопатического средства определяется врачом.

Если во время приема гомеопатического средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Применение у детей

Гомеопатическое средство АКОРДИЛУМ не применять у детей до 12 лет, перед применением у детей старше 12 лет проконсультируйтесь с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам средства.

Средство не должно применяться пациентами с алкогольной зависимостью.

Меры предосторожности

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача. Перед началом приема гомеопатического средства АКОРДИЛУМ необходимо удостовериться в отсутствии других заболеваний, требующих назначения иных специфических лекарственных средств. Во время лечения необходимо наблюдение врача, контроль артериального давления, ЭКГ. Если во время лечения симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, развиваются отеки нижних конечностей, необходимо обратиться к врачу. Необходима немедленная медицинская помощь при возникновении боли в области сердца с иррадиацией в руку, верхнюю

часть живота, шею, или в случае развития дыхательной недостаточности. В случае ухудшения состояния прием гомеопатического средства следует прекратить и обратиться к врачу. В разовой дозе гомеопатического средства (10 капель) содержится 61,6 мг спирта этилового, данное средство не следует принимать пациентам с заболеваниями печени, алкогольной зависимостью, эпилепсией, черепно-мозговой травмой и другими заболеваниями головного мозга со снижением судорожного порога, беременным и кормящим грудью женщинам, детям до 12 лет. Действие гомеопатического средства может уменьшаться при курении или под влиянием других вредных привычек (например, употребление алкоголя).

Применение у детей

Гомеопатическое средство АКОРДИЛУМ не применять у детей до 12 лет, перед применением у детей старше 12 лет проконсультируйтесь с врачом.

Беременность и период лактации

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта гомеопатическое средство не следует принимать во время беременности и лактации.

Побочное действие

Возможно развитие реакций гиперчувствительности (аллергических реакций). В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Исследования по оценке взаимодействия с другими лекарственными средствами не проведены. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Информация о случаях передозировки отсутствует. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Влияние на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами

Лекарственное средство содержит этиловый спирт. Во время приема лекарственного средства не рекомендовано вождение автомобиля и работа с движущимися механизмами.




Упаковка

Первичная упаковка: Капли гомеопатические по 20 мл во флаконах темного стекла с навинчивающейся крышкой из пропилена, с капельницей из полиэтилена.

Вторичная упаковка: Каждый флакон помещают вместе с инструкцией по применению в картонную упаковку.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.



Срок годности

3 года.

Условия отпуска из аптеки

Без рецепта.

Государственное предприятие «АКАДЕМФАРМ» (Республика Беларусь) по заказу СООО «АконитФарма».

Адрес: ул. академика В.Ф. Купревича, д.5, к.3, Минск, 220141, Республика Беларусь, тел/факс 8(017) 268-63-64.

