

<b>СОГЛАСОВАНО</b>	
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	
Приказ Министерства здравоохранения	
Республики Беларусь	
<b>ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ</b>	06.2014 г. № 697
по медицинскому применению лекарственного средства	
21.08.2014 г.	
<b>ПИРАНТЕЛ</b>	

Прочитайте внимательно листок-вкладыш перед тем, как начать прием препарата. Сохраните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться прочитать его заново. Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

**Международное непатентованное название:** Рурантел.

**Форма выпуска:** таблетки

**Лекарственная форма и ее описание:** круглые двояковыпуклые таблетки желтого цвета с возможным наличием незначительной мраморности и вкраплений.

**Состав:** каждая таблетка в качестве активного вещества содержит 125 мг и 250 мг пирантела основания (в виде пирантела эмбоната).

**Вспомогательные вещества:** магния стеарат, натрия крахмалгликолят (тип А), кукурузный крахмал.

**Фармакотерапевтическая группа:** Антигельминтные средства. Производные тетрагидропирамидина.

**Код ATC:** P02CC01.

#### **Фармакологические свойства.**

Пирантел является антигельминтным средством для лечения нематодозов. Эффективен против инвазий, вызываемых *Enterobius vermicularis*, *Ascaris lumbricoides*, *Ankylostoma duodenale* и *Necator americanus*. Пирантел вызывает нервно-мышечную блокаду гельминтов и обеспечивает их выведение из ЖКТ путем перистальтики. В просвете кишечника пирантел эффективен против зрелых и незрелых чувствительных к нему гельминтов. Личинки миграционных червей в тканях не поражаются. Практически не абсорбируется из кишечника: после приема концентрация пирантела в плазме крови минимальна (0.05-0.13 мкг/мл) и достигается в течение 1-3 часов. Более 50% препарата выводится через кишечник в неизменном состоянии. Менее 7% выводится почками в неизменном состоянии и в виде метаболита. Препарат не окрашивает кал в красный цвет.

#### **Показания к применению**

- энтеробиоз;
- аскаридоз;
- анкилостомидоз.

#### **Способ применения и дозы**

Для приема внутрь. Предназначен для взрослых и детей старше 6 лет (для детей младше 6 лет существует более адаптированная форма в виде суспензии). Пирантел можно принимать в любое время суток, без предварительного приема слабительных, необязательно натощак.

**При энтеробиозе и аскаридозе** обычная доза составляет 10-12 мг/кг за один прием:

- дети старше 6 лет: 1 таблетка 125 мг на 10 кг веса однократно;
- взрослые с массой тела менее 75 кг: 6 таблеток по 125 мг или 3 таблетки по 250 мг однократно;
- взрослые с массой тела более 75 кг: 8 таблеток по 125 мг или 4 таблетки по 250 мг однократно.

При энтеробиозе для полного удаления паразитов следует строго соблюдать правила гигиены. Для профилактики повторного заражения рекомендуется повторить прием лекарственного средства через 3 недели.

**Анкилостомидоз.** В зонах эндемии, в случае заражения *Necator americanus* или тяжелой инвазии *Ankylostoma duodenale* доза составляет 20 мг/кг массы тела в сутки (в 1-2 приема) в течение 2-3 дней или:

- дети старше 6 лет: 2 таблетки по 125 мг или 1 таблетка по 250 мг на 10 кг массы тела в сутки;
- взрослые с массой тела менее 75 кг: 12 таблеток по 125 мг или 6 таблеток по 250 мг однократно (1,5 г в сутки);
- взрослые с массой тела более 75 кг: 16 таблеток по 125 мг или 8 таблеток по 250 мг в сутки (2,0 г в сутки).

В случае заражения *Ankylostoma duodenale* в неэндемичных зонах (в случае легко протекающей инвазии) может быть достаточно дозы 10 мг/кг массы тела однократно.

#### *Пациенты с нарушением функции печени и почек.*

Пациентам с нарушением функции почек коррекции дозы не требуется.

У пациентов с нарушением функции печени пирантел может вызвать повышение активности «печеночных» трансаминаз, применять препарат следует с осторожностью, в сниженной дозе.

#### **Небольшое действие**

*Со стороны желудочно-кишечного тракта:* тошнота, рвота, боли в животе, диарея и потеря аппетита.

*Со стороны нервной системы:* головная боль, головокружение, сонливость или бессонница, галлюцинации, спутанность сознания, парестезии.

*Со стороны органа слуха и лабиринта:* нарушения слуха.

*Со стороны печени и желчевыводящих путей:* транзиторное повышение активности «печеночных» трансаминаз.

*Со стороны иммунной системы:* аллергические реакции (зуд, крапивница, экзантема)

*Общие нарушения и реакции в месте введения:* гипертермия, ощущение усталости.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к пирантелу и другим компонентам готовой лекарственной формы; миастения; печеночная недостаточность.

#### **Передозировка**

Из-за низкого уровня всасывания пирантела в желудочно-кишечном тракте его концентрация в плазме невелика. Обычно, даже при большой передозировке наблюдаются лишь расстройства пищеварительной системы и временные расстройства центральной нервной системы (усталость, головокружение, головные боли). В некоторых случаях может произойти увеличение содержания печеночных трансаминаз (АсТ). Специального антидота у пирантела нет. Для профилактики симптомов передозировки рекомендуется промыть желудок, а также контролировать функции дыхательной и сердечно-сосудистой системы.


#### **Меры предосторожности**

Во избежание повторного заражения необходимо строго соблюдать правила гигиены: мыть руки, подстригать и чистить ногти, не допускать расчесывания области промежности, ежедневно менять постельное и нижнее белье.

При энтеробиозе одновременно рекомендуется лечение всех членов семьи.

Заражение часто может не проявляться никакими симптомами.

После завершения лечения необходимо провести контрольное исследование кала на наличие яиц гельминтов.



### **Применение при беременности и лактации**

Данных о применении пирантела в период беременности у человека недостаточно для исключения всех возможных рисков. Препарат может использоваться в период беременности только в случае крайней необходимости, после тщательной оценки врачом соотношения пользы для матери и риска для плода.

На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

### **Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению другими сложными механизмами.**

Влияние пирантела на способность управлять автомобилем и на работу с техникой не изучено.

Учитывая возможные побочные эффекты со стороны нервной системы (головокружение, головная боль и др.), во время применения лекарственного средства необходимо соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не рекомендуется одновременное назначение левамизола, пиперазина. Пирантел может повышать концентрацию теофиллина в плазме крови.

### **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года. Срок годности указан на упаковке. Данное лекарственное средство нельзя использовать после даты, указанной на упаковке.

### **Условия отпуска**

Без рецепта врача.

### **Упаковка**

6 таблеток по 125 мг или 3 таблетки по 250 мг в контурной ячейковой упаковке №6×1 или №3×1 или в контурной безъячейковой упаковке №6×1 или №3×1, или в банках из полиэтилентерефталата №6 или №3 соответственно. Вместе с листком-вкладышем контурные ячейковые упаковки или контурные безъячейковые упаковки или банки помещаются в пачки из картона.

### **Информация о производителе**

ООО «Фармтехнология», 220024, г. Минск, ул. Корженевского, 22.

Тел./факс: (017) 309 44 88; e-mail: ft@ft.by; www.ft.by.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь