

**Листок-вкладыш**  
 (информация для пациентов)  
 по медицинскому применению лекарственного средства  
**Валерианы корневища с корнями**

<b>СОГЛАСОВАНО</b>									
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ									
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь									
от « <u>09</u> <u>04</u> <u>2018</u> г. № <u>330</u>									
Б.М. № <u>3</u> от « <u>26</u> <u>05</u> <u>2018</u> г.									

**Торговое название:** Валерианы корневища с корнями.

**Международное непатентованное название (МНН):** Valerianae radix.

**Описание.** Кусочки корневищ, корней и столонов различной формы от желтовато-серого до бледного коричневато-серого цвета, проходящие сквозь сито (5600). Запах сильный, ароматный. Вкус пряный, сладковато-горьковатый. Валерианы корневища с корнями содержат эфирные масла, главную часть которых составляют сложный эфир борнеола и изовалериановой кислоты, свободную валериановую кислоту, борнеол, органические кислоты, алкалоиды (валерин, хатинин), дубильные вещества, сахара и другие биологически активные вещества.

**Состав.** Валерианы корневища с корнями 50 г и 100 г.

**Форма выпуска.** Измельченное сырье.

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие снотворные и седативные средства.

**Код АТХ:** N05CM09.

#### **Показания для применения.**

Применяют при повышенной нервной возбудимости (неврастения) и нарушениях сна.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозировка.** 8 г (1 столовая ложка) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин.

Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослым и детям старше 12 лет при повышенной нервной возбудимости (неврастении): по 1/4 стакана 2-3 раза в сутки. При нарушениях сна: по 1/4 стакана за полчаса – один час до сна, в случае необходимости рекомендован предварительный прием 1/4 стакана настоя в вечернее время.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.


Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства. Особенности применения у пациентов с нарушениями функции печени и/или почек: информация отсутствует.

**Побочное действие.** Возможно развитие аллергических реакций (кожная сыпь, зуд, гиперемия, отек кожи). Возможно возникновение головной боли, общей слабости, снижения работоспособности, сонливости, раздражительности, тревожности, желудочно-кишечных расстройств (тошнота, боли в животе). Большие дозы могут привести к брадикардии и аритмии, а также снижению моторики кишечника (запор).

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в инструкции по применению, необходимо обратиться к врачу.

**Противопоказания.** Гиперчувствительность к валериане, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

**Применение у детей.** Безопасность применения у детей в возрасте до 12 лет не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных назначать детям до 12 лет не рекомендуется.




**Применение при беременности и лактации.** Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

**Передозировка.** Длительный прием лекарственного средства в дозах, превышающих рекомендованные, вызывает чувство угнетенности, головную боль, сонливость, снижение работоспособности, дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта, тошноту, нарушение сердечной деятельности (брадикардию). При однократном приеме чрезмерно высокой дозы (около 20 г корня валерианы) возможно развитие болей в животе спастического характера, чувства стеснения в груди, головокружения, общей слабости, трепора рук и расширения зрачков. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. При однократном приеме высокой дозы рекомендовано провести индукцию рвоты, промывание желудка (не позднее 2 часов после приема препарата). При длительном приеме лекарственного средства в высоких дозах рекомендована отмена лекарственного средства. Специфического антидота нет. Симптоматическая терапия.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Данные о взаимодействиях с другими лекарственными средствами ограничены. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом. Комбинация препаратов валерианы с синтетическими седативными средствами требует предварительной консультации врача и наблюдения врача в процессе лечения.

**Меры предосторожности.** Из-за постепенного развития эффекта препарата валерианы не рекомендовано применять в случаях экстренной необходимости уменьшения симптомов психического возбуждения и нарушений сна.

Если в течение 2 недель приема лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.



**Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами.** Во время лечения следует отказаться от вождения автотранспорта и работы с движущимися механизмами.

**Условия хранения.** Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре от 15°C до 25°C.

Приготовленный настой хранить при температуре от 8°C до 15°C не более 2 суток.

**Срок годности.** 3 года.

**Условия отпуска из аптек.** Без рецепта.

**Упаковка.** По 50 г и 100 г в картонной пачке с внутренним бумажным пакетом.

**Производитель.** Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Совхоз «Большое Можейково».

**Адрес.** Республика Беларусь, 231502, Гродненская область, Щучинский район, агрогородок Большое Можейково, ул. Ленина-11.

Тел. 8(01514) 36-3-18

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь