



ОДОБРЕНО
Министерством здравоохранения
Республики Беларусь
Регистрационное удостоверение
№

ТРИ-ВИ ПЛЮС® (TRI-V PLUS®)
таблетки, покрытые оболочкой
Листок-вкладыш
(для пациентов)

Торговое название

Три-Ви Плюс.

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые оболочкой.

Описание

Небольшая таблетка овальной формы персикового цвета.

Состав

Активные ингредиенты: витамин А (бета-каротин) 5000 МЕ, Витамин Е (dl-альфа токоферила ацетат) 30 МЕ, Витамин С (аскорбиновая кислота) 60 мг, цинк (оксид цинка) 40 мг, селен (хелатный комплекс аминокислот) 40 мкг, медь (оксида меди) 2 мг.

Неактивные ингредиенты дикальция фосфат, микрокристаллическая целлюлоза (E460), стеариновая кислота (E570), кроскармеллозный натрий, магния стеарат (E572), кремния диоксид (E551), желатин, сахароза, крахмал кукурузный, смесь токоферолов, натрия аскорбат, трикальция фосфат, аскорбилпальмитат, поливинилпирролидон, натрия бензоат, сорбиновая кислота.

Оболочка: гипромеллоза, диоксид титана (E171), магния силикат (E553a), триацетин (E518), минеральное масло (E905), FD&C Желтый №6 Лак (E110).

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат, содержащий витамины, минералы, микроэлементы.

Фармакологические свойства обусловлены свойствами входящих в состав ингредиентов.

Показания к применению

Для повышения общей устойчивости организма при комплексной терапии гриппа, простудных заболеваний, инфекций и интоксикаций; для профилактики заболеваний и повреждений организма, вызванных стрессами, переутомлением, повышенной физической нагрузкой, неблагоприятными экологическими факторами, в первую очередь, повышенным радиационным фоном; для снижения степени тяжести соматических заболеваний; для замедления процессов старения у лиц пожилого возраста; после проведения лучевой и химиотерапии онкологических заболеваний.

Способ применения и дозы

Принимать внутрь во время еды по одной таблетке в сутки.

Лицам, проживающим в экологически неблагоприятных регионах, рекомендуется курсовой прием препарата на протяжении 3-х месяцев с последующим месячным перерывом перед повторным курсом.

Детям до 12 лет – по указанию врача.

Использование с лечебной целью должно быть согласовано с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Противопоказания

Аллергическая реакция на любой из ингредиентов препарата.

Заболевания ЦНС с повышенным внутричерепным давлением, тяжелые нарушения функций печени, острый период инфаркта миокарда.

Передозировка

Избыточное накопление бета-каротина в организме может вызвать желтушность слизистых и кожи, которая исчезает вскоре после отмены препарата.

Длительное применение больших доз аскорбиновой кислоты приводит к угнетению инсулярного аппарата поджелудочной железы с гипергликемией, реже с глюкозуррией, в редких случаях может спровоцировать развитие сахарного диабета.

Длительный прием высоких доз витамина Е сопровождается подавлением активности витамина К с появлением геморрагий в ЖКТ, нарушением заживления ран.

При первых проявлениях передозировки необходимо прекратить применение препарата вплоть до исчезновения всех симптомов.

Особые указания и меры предосторожности

Необходимо соблюдать осторожность при назначении больным с острой и хронической почечной недостаточностью, декомпенсированными пороками сердца, кардиосклерозом.

Не следует назначать больше одной таблетки в день больным с повышенной свертываемостью крови, тромбозами, склонностью к тромбозам. При длительном использовании препарата больными с сахарным диабетом необходим регулярный контроль уровня сахара в крови и моче.

Беременность и лактация

Возможно применение препарата во время беременности и лактации только после оценки соотношения риск-польза лечащим врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Бета-каротин является синергистом витамина Е. Целесообразно сочетание витамина С с НПВС, глюкокортикостероидами.

Аскорбиновая кислота устраняет тормозящее влияние этих препаратов на синтез коллагена, фагоцитарную активность нейтрофилов.

Селен является синергистом витамина Е, их совместное применение существенно усиливает антиоксидантный эффект.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Форма выпуска

30 таблеток во флаконе. Флакон вместе с листком-вкладышем помещен в картонную упаковку.

Условия отпуска

Без рецепта.

Название фирмы-заявителя/производителя, адрес

Байер Консьюмер Кэр АГ,

Петер Мериан-Штрассе 84, 4052 Базель, Швейцария

Контракт Фармакал Корпорейшн,

135 Адамс Авеню, Хопог, Нью-Йорк 11788, США