


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Листок-вкладыш (информация для пациента)

ТРАВОПАССИТ-ЭКЗОН

Торговое название. ТРАВОПАССИТ-ЭКЗОН.

Лекарственная форма. Капсулы.

Международное непатентованное название. ---

Описание. Капсулы твердые желатиновые № 0 цилиндрической формы с полусферическими концами; корпус белого цвета, крышечка оранжевого цвета.

Состав. Каждая капсула содержит сухие экстракты: древогубца метельчатого семян (13:1) (экстрагент: водно-спиртовой раствор) – 9,0 мг, центеллы азиатской надземной части (20:1) (экстрагент: водно-спиртовой раствор) – 48,0 мг, витании снотворной корней (8:1) (экстрагент: водно-спиртовой раствор) – 90,0 мг, эмблики лекарственной плодов (4:1) (экстрагент: вода очищенная) – 180,0 мг;

вспомогательные вещества: тальк очищенный, кремния диоксид коллоидный безводный, целлюлоза микрокристаллическая;

состав оболочки капсулы: желатин, глицерин, титана диоксид, натрия лаурилсульфат, кремния диоксид коллоидный безводный, солнечный закат желтый Е-110, понко 4R Е-124, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие лекарственные средства.
Код ATХ: V03AX.

Область применения. Применяется в качестве симптоматического средства в комплексной терапии нетяжелых функциональных нарушений центральной нервной системы (неврастения, нарушения сна).

Способ применения и дозировка.

Внутрь, независимо от приема пищи.

Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день. При необходимости суточную дозу можно увеличить до 2 капсул 3 раза в день.

Длительность лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Побочные действия.

Возможны аллергические реакции на компоненты лекарственного средства. Возможно появление сонливости, утомляемости, артериальной гипотензии, атаксии, головной боли и тошноты.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания.

- повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства;
- детский возраст до 18 лет;
- беременность, период кормления грудью.

Передозировка.

О случаях передозировки не сообщалось, однако в случае передозировки необходимо симптоматическое лечение.



Меры предосторожности.

Перед началом применения проконсультируйтесь с врачом.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Лекарственное средство содержит красители солнечный закат желтый Е 110, понсо 4R Е 124 и может вызывать аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью.

Безопасность лекарственного средства во время беременности и кормления грудью не изучалась, в связи с чем противопоказано применять Травопассит - Экзон во время беременности и кормления грудью.

Влияние на возможность управления транспортными средствами и работы с механизмами.

Лекарственное средство не назначают водителям и пациентам, работающим с механизмами и устройствами, требующими повышенного внимания и быстрых двигательных реакций.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Травопассит - Экзон усиливает действие лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему.

Сообщите врачу обо всех принимаемых лекарственных средствах, включая аюрведические.

Условия хранения и срок годности.

Хранить при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.

Срок годности - 3 года. Не использовать после срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска.

Без рецепта врача.

Упаковка. По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и гибкой упаковки на основе фольги алюминиевой ГУ ФТЛ; 3 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачке картонной.

Информация о производителе.

ОАО «Экзон», Республика Беларусь,
225612, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, 202.