

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)

по медицинскому применению лекарственного средства
Метромезол-Дент®

Перед использованием лекарственного средства Вы должны проконсультироваться с врачом.

Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш перед тем, как начать использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.

Для достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в листке-вкладыше.

Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.

Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу или сотруднику аптеки.

Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшилось или улучшение не наступило после проведенного лечения.

Это лекарственное средство прописано только Вам. Не передавайте его другим лицам. Это может нанести им вред, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Торговое название: Метромезол-Дент®.

Международное непатентованное название: отсутствует.

Форма выпуска: гель стоматологический.

Состав: каждая туба (20 г) содержит: действующих веществ: метронидазола – 200 мг, хлоргексидина диглюконата (в виде хлоргексидина диклюконата 20 % раствора) – 10 мг; вспомогательные вещества: пропиленгликоль, карбомер, динатрия эдетат, сахарин натрия, левоментол, натрия гидроксид, воду очищенную.

Описание: гель от белого до белого с желтоватым оттенком цвета однородной консистенции.

Фармакотерапевтическая группа: Противомикробные и антисептические средства для наружного применения при заболеваниях полости рта.

Код АТХ: А01АВ11.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Показания к применению

Инфекционно-воспалительные заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта:

- острый и хронический (отечный, гиперпластический, атрофический) гингивит;
- острый язвенно-некротический гингивит Венсана;
- острый и хронический пародонтит;
- периодонтит, периодонтальный абсцесс (в составе комбинированной терапии).

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость метронидазола, хлоргексидина, а также производных нитроимидазола. Непереносимость любых компонентов, входящих в состав лекарственного средства. Детский возраст до 6 лет.

Способ применения и дозы


Местно, только для стоматологического применения. Доза геля на участок десны, окружающей один зуб, составляет каплю размером с горошину.

Взрослым и детям старше 6 лет при воспалении десен (гингивит) гель наносится на область десен 2 раза в день тонким слоем пальцем или ватной палочкой, смывать гель не рекомендуется. После нанесения геля следует воздержаться от питья и приема пищи в течение 30 мин. Длительность курса лечения составляет в среднем 7–10 дней.

При пародонтите, после снятия зубных отложений и обработки стоматологом полости рта в дальнейшем аппликации геля пациент может проводить самостоятельно, нанося гель на область десен 2 раза в день в течение 7 – 10 дней.

Для профилактики обострений хронического гингивита и пародонтита гель наносят на область десен 2 раза в день в течение 7–10 дней. Профилактические курсы лечения проводятся 2 – 3 раза в год.

У пациентов с нарушениями функции печени или почек коррекция дозы препарата не требуется.



У пожилых пациентов коррекция дозы препарата не требуется.

Передозировка

Случаи передозировки при местном применении маловероятны.

Меры предосторожности

Применение геля не заменяет гигиенической чистки зубов, поэтому во время курса лечения чистка зубов должна быть продолжена. Следует избегать попадания геля в глаза. Не следует применять гель более 10 дней без консультации со стоматологом.

Во время применения лекарственного средства не допускается применение алкогольсодержащих напитков и лекарственных средств, поскольку это может привести к возникновению острой реакции в виде спазмов в области желудка, тошноты и рвоты, головной боли, приливов крови к лицу. Если при использовании геля у Вас появились подобные симптомы прекратите применение лекарственного средства и незамедлительно обратитесь к врачу!

Применение в педиатрической практике. Лекарственное средство не рекомендуется использовать у детей в возрасте до 6 лет.

Беременность и лактация. Не рекомендуется назначать препарат беременным женщинам в первом триместре беременности. В период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Влияние на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами.

Лекарственное средство не влияет на способность к управлению автотранспортом, механизмами и операторскую деятельность.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При местном применении в рекомендованных дозах системного взаимодействия геля с другими лекарственными средствами не выявлено.

Тем не менее, следует соблюдать осторожность при использовании геля у лиц, которые применяют непрямые антикоагулянты (возможно повышение

риска кровотечений). Может повысить токсичность при одновременном применении. Прием фенобарбиталсодержащих препаратов (Корвалол, Валокордин и им подобные средства), фенитоина снижает эффективность лекарственного средства, прием циметидина увеличивает риск развития нежелательных побочных эффектов лекарственного средства.

Побочное действие

При местном применении геля риск развития системных побочных явлений невелик, редко (с частотой 1 реакция на 1 000–10 000 курсов применения препарата) могут наблюдаться: головокружение или головная боль, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница), нарушения вкуса, затрудненное глотание, тошнота и рвота, лекарственный стоматит и гингивит.

Сообщение о предполагаемых побочных реакциях

Если у Вас появились какие-либо симптомы, описанные или не описанные в данной листовке-вкладыше, обязательно сообщите об этом Вашему лечащему врачу!

Упаковка

20 г в тубах алюминиевых с бушонами. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона (упаковка № 1).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Информация о производителе

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177)735612, 731156.