



**ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА КАРДУРА
(ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)**

**Торговое (патентованное) название лекарственного средства
КАРДУРА®**

Международное (непатентованное) название

Доксазозин

Лекарственная форма

Таблетки по 2 и 4 мг для приема внутрь.

Код АТХ

C02CA04

Фармакотерапевтическая группа

Кардура относится к группе лекарств, которые называются блокаторы альфа1-адренорецепторов и используется для лечения артериальной гипертонии и доброкачественной гиперплазии предстательной железы (простаты).

Описание

Кардура 2 мг – белые, овальные, двояковыпуклые таблетки с риской.

Кардура 4 мг – белые, ромбовидные, двояковыпуклые таблетки с риской.

Состав

Активный компонент: в каждой таблетке содержится доксазозина мезилат в количестве, эквивалентном 2 мг или 4 мг доксазозина.

Перечень вспомогательных компонентов: натрия крахмалгликолят, целлюлоза микрокристаллическая (E460), лактоза, магния стеарат (E470), натрия лаурилсульфат (E487).

Показания к применению

Препарат Кардура показан для лечения повышенного давления крови (артериальной гипертонии). Кардура вызывает расслабление сосудов и облегчает прохождение по ним крови. Это приводит к снижению давления. Кардура может применяться в виде монотерапии или в комбинации с другими препаратами, такими как тиазидные диуретики, бета-адреноблокаторы, антагонисты кальция или ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента.

Препарат Кардура показан для лечения клинических симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) и ослабленного мочеотделения, обусловленного ДГПЖ. Кардуру можно применять у пациентов с ДГПЖ с нормальным или повышенным артериальным давлением.

Способ применения и дозы


Если Вы впервые принимаете препарат Кардура, то обычная доза составляет 1 мг один раз в сутки. В некоторых случаях она может быть увеличена до максимальной дозы - 8 мг в сутки при лечении симптомов увеличенной простаты или 16 мг при лечении гипертонии. Препарат Кардура можно принимать как утром, так и вечером, в зависимости от назначения врача.

Препарат Кардура лучше всего принимать в одно и то же время дня и запивать водой. Без консультации врача не меняйте дозу и не прекращайте прием таблеток.

Не беспокойтесь, если вы забыли принять таблетку, то пропустите прием этой дозы, а затем принимайте препарат, как обычно.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к хиназолинам, доксазозину или к любому



компоненту препарата.

Предупреждения

Вы должны предупредить врача в случае имеющихся у Вас следующих сопутствующих состояний:

- заболевания печени
- настоящая или планируемая беременность
- кормление грудью
- заболевания сердца
- артериальная гипотензия или постуральная гипотензия, проявляющаяся слабостью, головокружением, или, редко, обмороками
- возраст менее 18 лет.

Наличие любого из вышеперечисленных состояний означает, что Кардура может оказаться неподходящим для Вас препаратом, Ваш врач даст Вам совет. При оперативных вмешательствах по поводу катаракты необходимо информировать хирурга-офтальмолога до операции о приеме альфа-адреноблокаторов в настоящее время или в прошлом.

Не принимайте препарат Кардура, если у Вас выявлены непереносимость галактозы или дефицит лактазы или мальабсорбции глюкозы-галактозы, т. к. препарат содержит лактозу.

Побочное действие

Нарушения со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения: головокружение, шум в ушах

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе, запор, диарея, диспепсия, метеоризм, сухость во рту, рвота

Общие расстройства и нарушения в месте введения: астения, отеки, утомляемость, недомогание

Нарушения со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, постуральное головокружение, сонливость, обморок, гипестезии, парестезии, трепор, изменение вкуса, нарушение памяти

Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: ринит, обострение имеющегося бронхоспазма, кашель, одышка, носовое кровотечение, отек гортани

Нарушения со стороны крови и лимфатической системы: лейкопения, тромбоцитопения

Нарушения со стороны органа зрения: нечеткость зрения, IFIS (интраоперационный синдром атоничной радужки), нарушения аккомодации, фотофобия, слезотечение

Общие расстройства и нарушения в месте введения: боль, лихорадка, озноб, бледность, отек лица, снижение температуры тела у возрастных пациентов

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей: холестаз, гепатит, желтуха

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции

Влияние на результаты лабораторных и инструментальных исследований: отклонение от нормы лабораторных показателей функции печени, увеличение массы тела, повышение мочевины и креатинина плазмы

Нарушения со стороны обмена веществ и питания: анорексия, повышение аппетита, подагра, гипокалиемия, гипогликемия, жажда

Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: артрит, боль в спине, мышечные спазмы, мышечная слабость, миалгия

Нарушения психики: возбуждение, беспокойство, депрессия, бессонница, нервозность

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: дизурия, гематурия, нарушение мочеиспускания, учащение мочеиспускания, никтурия, полиурия, недержание мочи

Нарушения со стороны половых органов и молочной железы: гинекомастия,

импотенция, приапизм, ретроградная эякуляция

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: алопеция, зуд, пурпур, кожная сыпь, крапивница

Нарушения со стороны сосудов: «приливы», снижение АД, постуральная гипотензия
При использовании препарата Кардура для лечения артериальной гипертонии наблюдались следующие дополнительные нежелательные явления, которые могут быть и не связаны с приемом препарата: боль в груди, тахикардия, сердцебиения, стенокардия, инфаркт миокарда, нарушения мозгового кровообращения и сердечные аритмии. При появлении подобных явлений немедленно обратитесь к врачу. Если у Вас возникнут какие-либо нежелательные реакции, не указанные в данной инструкции, или у Вас есть вопросы по поводу эффективности препарата, обратитесь к врачу или фармацевту.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Если Вы принимаете другие лекарства, то перед началом приема таблеток сообщите об этом врачу, так как они могут повлиять на эффективность препарата Кардура.

Управление транспортным средством или механизмами

При вождении автомобиля или пользовании техникой соблюдайте осторожность. Таблетки могут повлиять на способность управлять автомобилем или механизмами, особенно в начале лечения.

Передозировка

Одномоментный прием большого числа таблеток может привести к ухудшению Вашего самочувствия. Прием нескольких таблеток может представлять опасность. Немедленно обратитесь к врачу или в ближайшую больницу.

Условия хранения

Хранить при температуре ниже 30°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Перед применением препарата проверьте дату истечения срока годности, указанную на коробке. Не применяйте препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

Таблетки по 2 мг и 4 мг.

10 таблеток в блистере. В картонной коробке 3 блистера с инструкцией по применению.

Условия отпуска из аптек

По рецепту врача.

Фирма-производитель

Пфайзер Мануфактуринг Германия ГмбХ, Германия

Представительство "PFIZER H.C.P. CORPORATION" в Республике Беларусь: г. Минск, пр-т Независимости 169-902, телефон 375-17-218-14-80, факс 375-17-218-14-81