


По применению препарата

ОТИПАКС®

**Торговое название.**

ОТИПАКС®

Международное непатентованное название.

нет

Лекарственная форма.

Капли ушные.

Состав.

1 г раствора содержит:

Активные вещества:

лидокаина гидрохлорид 10 мг;

феназон 40 мг;

Вспомогательные вещества:

Натрия тиосульфат, этанол, глицерол, вода.

Описание.

Прозрачный, бесцветный или желтоватый раствор с запахом спирта.

Фармакотерапевтическая группа.

Средства, применяемые в отологии. Аналгетики и анестетики.

Код АТХ.

[S02DA30]

Фармакологические свойства.

Феназон обладает противовоспалительным и анальгезирующим действием. Лидокаин обладает местным анальгезирующим действием. Препарат не проникает в организм при неповрежденной барабанной перепонке.

Показания.**2443 - 2017**

Местное симптоматическое лечение болезненных состояний среднего уха при условии сохранения целостности барабанной перепонки:

- острый средний отит с застойными явлениями;
- средний отит, как осложнение после гриппа;
- баротравматический средний отит.

Противопоказания.

- гиперчувствительность к компонентам препарата.
- перфорация барабанной перепонки.

С осторожностью.

Не используйте Отипакс® и обратитесь к врачу:

- при наличии выделений из уха любого характера;
- при травматическом повреждении барабанной перепонки;
- при перфорации барабанной перепонки любой природы;
- при хроническом гнойном среднем отите;
- при резком снижении слуха, которое может быть признаком перфорации барабанной перепонки.

Беременность и лактация.

Ограничения применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют при условии неповрежденной барабанной перепонки.

Побочное действие.

Существует риск возникновения аллергических реакций, раздражения и гиперемии слухового прохода.


В случае применения препарата при перфорированной барабанной перепонке, препарат может вступить в контакт со структурами среднего уха и привести к возникновению осложнений.

Информация для спортсменов: препарат содержит активный компонент, способный дать положительную реакцию при допинг-контроле.

Способ применения и дозы.

Отипакс® применяется местно, путем закапывания в наружный слуховой проход 2-3 раза в день по 4 капли.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь



Во избежание соприкосновения холодного раствора с барабанной перепонкой, флакон перед применением следует согреть в ладонях.

Продолжительность применения препарата Отипакс® не более 10 дней, после чего врачу следует пересмотреть назначенное лечение.

Применение у детей.

Отипакс® показан к применению у детей с рождения 2-3 раза в день по 4 капли в наружный слуховой проход.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

В настоящее время информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует.

Влияние на способность к вождению транспорта и управлению механизмами.

Отсутствует.

Форма выпуска.

Капли ушные

По 16 г во флакон из янтарного стекла с завинчивающейся крышкой с капельницей, упакованной в блистер ПВХ/бумага, помещен в картонную коробку с вложенной инструкцией по медицинскому применению.

Срок годности.

3 года. После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 1 месяца.

Условия хранения.

Хранить при температуре не выше 30° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек.

Без рецепта.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь

2443 - 2017

Производитель.

Biocodex,
7, avenue Gallieni,
94250 Gentilly, France.

Биокодекс,
7, авеню Галльени,
94250 Жантийи, Франция

Получить дополнительную информацию о препарате, а также направить свои претензии и информацию о нежелательных явлениях можно по следующему адресу:
ООО «БИОКОДЕКС»

107045, Россия, г. Москва, Последний пер., д.11, стр.1

Тел.: 8-8200-491-0058 (бесплатный номер для звонков из Беларуси)

Тел.: +7(495)783-26-80

Факс: +7(495)783-26-81

e-mail: phv@biocodex-corp.ru

Адрес в сети Internet: www.biocodex.ru

