

front side



СОГЛАСОВАНО  
Министерством здравоохранения  
Республики Беларусь  
Регистрационное удостоверение  
№ 2729/97/02107/11

**TUSSIN® PLUS (TUSSIN® PLUS)**

сироп

**Листок-вкладыш (для пациентов)**

**Торговое название**

Туссин Плюс.

**Лекарственная форма**

Сироп.

**Описание**

Красный сироп с запахом вишни.

**Состав**

Активные ингредиенты (5 мл содержит):  
гвайфенезин 100 мг, декстрометорфана  
гидробромид (безводный) 10 мг.  
Неактивные ингредиенты: бензоат натрия  
(E211), лимонная кислота (безводная) (E330),  
глицерин (безводный) (E422), вишневый аро-  
матизатор, ментол (лево), кукурузный сироп,  
сахароза, натрий (E954), очищенная вода,  
краситель FD&C Красный № 40 (E129).

**Фармакологические свойства**

Гвайфенезин обладает отхаркивающим дей-  
ствием, разжижает бронхальный секрет и

снижает вязкость мокроты, увеличивает сек-  
ретию слизи и способствует усилению уда-  
ления мокроты и переходу непродуктивного  
кашля в продуктивный.

Декстрометорфана гидробромид угнетает  
возбудимость кашлевого центра и подавля-  
ет кашель независимо от его происхождения,  
не угнетая при этом дыхательный центр.  
Не оказывает наркотического, болеутоля-  
ющего и снотворного действия.

Содержащиеся в препарате глицерин и мен-  
тол оказывают смягчающее действие на  
слизистую оболочку глотки.

**Показания к применению**

Для уменьшения интенсивности сухого  
раздражающего кашля, нормализации вы-  
деления бронхальной слизи при острых  
респираторных вирусных инфекциях (в  
том числе и гриппе), ларингите, трахеите,  
бронхите; при обострении хронических  
заболеваний верхних дыхательных путей,  
сопровождающихся непродуктивным каш-  
лем.

**Способ применения и дозы**

Разовая доза (1 чайная ложка = 1 TSP на  
мерном стаканчике):  
взрослым и детям старше 12 лет – по 2  
чайные ложки каждые 4 часа;  
детям от 6 до 12 лет – по 1 чайной ложке  
каждые 4 часа;

детям до 6 лет – по назначению врача.  
Препарат необходимо принимать после еды  
при помощи чайной ложки или мерного ста-  
канчика.

**Побочные действия**

Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота.  
Со стороны нервной системы: головноокруже-  
ние, головные боли, сонливость.

reverse side

Colors	Black
Scale	1:1

**Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствитель-  
ность к ингредиентам препарата, тяжелые  
органические заболевания нервной сис-  
темы.

**Передозировка**

Может наблюдаться усиление описанного  
побочного действия.

**Особые указания**

**и меры предосторожности**  
Соблюдать осторожность в назначении пре-  
парата беременным и кормящим грудью, а  
также пациентам с язвенной болезнью же-  
лудка и 12-перстной кишки в стадии обо-  
стрения.

**Взаимодействие с другими**

**лекарственными средствами**  
Не следует назначать одновременно с ан-  
тидепрессантами из группы ингибиторов  
МАО, а также в течение 2 недель после их  
отмены.

**Условия хранения**

При температуре не выше +25 °С, в недо-  
ступном для детей месте. Не хранить в хо-  
лодильнике.

**Срок годности**

3 года. Не использовать по истечении  
срока годности, указанного на упаковке.

**Форма выпуска**

118 мл во флаконе. Флакон из нейлоше-  
гося материала вместе с мерным стакан-  
чиком и листком-вкладышем помещен в  
картонную коробку. Колпачок не может быть  
открыт ребенком.

**Условия отпуска**

По рецепту.

**Название фирмы-заявителя/**

**производителя, адрес**

Байер Консьюмер Кэр АГ,

Петер Мерлан-Штрассе 84, 4052 Базель,

Швейцария

Био-Фарм, Инк.,

2091 Хартел Стрит, Левиттаун,

Пенсильвания 19057, США

10543/8/ВУ/2

Байер