

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
от «14» 09. 2013 № 969

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

**БИФИДУМБАКТЕРИН ФОРТЕ®**  
порошок для приема внутрь

**Торговое наименование** БИФИДУМБАКТЕРИН ФОРТЕ®

**Лекарственная форма** Порошок для приема внутрь

**Описание** Порошок от светло-серого до темно-серого цвета с черными частицами угля и возможными вкраплениями бежевого цвета со слабым кисломолочным запахом.

**Состав**

**В одном пакете (5 доз):**

активное вещество – бифидобактерии (*Bifidobacterium bifidum* № 1) сорбированные на активированном угле – не менее 50 млн колониеобразующих единиц ( $5 \times 10^7$  КОЕ).

вспомогательное вещество – лактозы моногидрат – до 0,85 г.

**Фармакотерапевтическая группа**

Атидиарейные микроорганизмы.

**Показания для применения**

Профилактика и лечение диареи, вызванной вирусными и бактериальными инфекциями желудочно-кишечного тракта, у младенцев, детей и взрослых.

Диарея путешественников.

Диарея, сопровождающая применение антибиотиков широкого спектра действия и химиотерапевтических средств.

Диарея, сопровождающая лучевую терапию в области брюшной полости и органов малого таза. Для восстановления микробиологического равновесия в кишечнике при острых и хронических воспалительных заболеваниях толстого и тонкого кишечника у детей и взрослых, протекающих на фоне нарушения микрофлоры с дефицитом бифидобактерий.

**Противопоказания для применения**

Врожденная недостаточность лактазы. Нарушение всасывания глюкозы-галактозы.

**Режим дозирования, курс лечения и способ введения**

В зависимости от тяжести заболевания Бифидумбактерин форте® применяют в обычных или увеличенных дозах.

Применение у взрослых

С лечебными целями в обычных дозах – по 2 пакета 2-3 раза в сутки. Курс лечения при диарее, вызванной вирусными и бактериальными инфекциями желудочно-кишечного тракта, диарее путешественников 5-7 дней, при других заболеваниях 15-21 день (определяется характером и

тяжестью заболевания). При необходимости курс лечения можно повторить 2-3 раза, каждый курс проводится через месяц после окончания предыдущего курса лечения.

С лечебными целями в **увеличенных дозах** применяют при диарее, вызванной вирусными и бактериальными инфекциями желудочно-кишечного тракта, диарее путешественников с первых суток заболевания по 10 пакетов 3 раза в день. Курс лечения 1-3 дня в зависимости от тяжести состояния.

С профилактическими целями – по 1-2 пакета 1-2 раза в сутки. Профилактический курс проводят 10-15 дней 2-3 раза в год.

#### Применение у детей

С лечебными целями в **обычных дозах** применяют у детей (в том числе недоношенных) с первых дней жизни:

- детям до 1 года по 1 пакету 2-3 раза в сутки,
- детям с 1 года и старше по 1 пакету 3-4 раза в сутки.

<b>СОГЛАСОВАНО</b> МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Курс лечения при диарее, вызванной вирусными и бактериальными инфекциями желудочно-кишечного тракта, диарее путешественников 5-7 дней, при других заболеваниях 15-21 день (определяется характером и тяжестью заболевания). При необходимости курс лечения можно повторить 2-3 раза, каждый курс проводится через месяц после окончания предыдущего курса лечения.

С лечебными целями в **увеличенных дозах** применяют у детей с 1 года и старше при диарее, вызванной вирусными и бактериальными инфекциями желудочно-кишечного тракта, диарее путешественников с первых суток заболевания по 5 пакетов 6 раз в день. Курс лечения 1-3 дня в зависимости от тяжести состояния.

С профилактическими целями – детям до 1 года по 1 пакету, всем остальным по 1-2 пакета 1-2 раза в сутки. Профилактический курс проводят 10-15 дней 2-3 раза в год.

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в 5 пакетах препарата содержится 0,35 ХЕ.

Бифидумбактерин форте® принимают во время приема пищи, при необходимости независимо от приема пищи. Препарат перед употреблением смешивают с жидкой пищей, желатильно кисломолочным продуктом, новорожденным и детям грудного возраста – с материнским молоком или смесью для искусственного вскармливания. Можно смешать препарат с 30-50 мл кипяченой воды комнатной температуры, при этом образуется мутная взвесь с частичками сорбента черного цвета. Полученную водную взвесь следует выпить, не добиваясь полного растворения.


При диарее у взрослых и детей рекомендуется адекватная пероральная регидратация. Необходимо придерживаться щадящей диеты, исключить из рациона свежие овощи, фрукты, продукты, содержащие большое количество клетчатки.

#### **Меры предосторожности при применении**

Не следует принимать Бифидумбактерин форте® одновременно с алкоголем.

Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед приемом Бифидумбактерина форте®, если у Вас:

- температура тела выше 38 °С,
- острая боль в животе,
- следы крови или слизи в стуле,
- диарея длится более двух дней и сопровождается сильными болями в животе, обезвоживанием и потерей веса,
- хронические заболевания: сахарный диабет, СПИД.



#### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

При одновременном приеме Бифидумбактерина форте® с витаминами (особенно группы В) действие препарата усиливается. При приеме антибиотиков рекомендованный интервал между приемом антибиотика и препарата Бифидумбактерин форте® составляет 3 – 4 часа.

#### **Возможность применения препарата в периоды беременности и грудного вскармливания**

Препарат разрешен для применения женщинам в периоды беременности и грудного вскармливания. Особых условий приема нет.

#### **Возможность применения препарата лицами с нарушением функций печени и почек**

Нарушение функций печени и почек не является противопоказанием для применения препарата, так как механизм его действия не связан с процессом всасывания в системный кровоток.

#### **Влияние препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

#### **Симптомы передозировки**

Случаев передозировки не наблюдалось.

#### **Действия пациента при пропуске очередного приема лекарственного средства**

Препарат не вызывает развития эффекта отмены лекарственного средства. В случае пропуска приема препарата нужно продолжить курс лечения.

#### **Возможные побочные действия**

Не установлены.

#### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 10 °С. Нижняя граница температуры не лимитируется.

Хранить в недоступном для детей месте

**Срок годности**

18 месяцев.

**Препарат не пригоден для применения:**


- по истечении срока годности,
- при изменении внешнего вида,
- при отсутствии или нечеткой маркировке на первичной упаковке, при нарушении герметичности первичной упаковки.

**Условия отпуска**

Отпускается без рецепта.

**Форма выпуска**

Порошок в пакете из многослойного металлополимерного материала. По 10 или 30 пакетов по 5 доз с инструкцией по применению в пачке из картона.



**Наименование, адрес предприятия-производителя лекарственного препарата**

Закрытое акционерное общество «Партнер», Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 31.

Генеральный директор ЗАО «Партнер»



И.И. Вайншток

*Виница А.И.*