

16.11.2017

3
НД РБ

2528 - 2017

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
(информация для пациента)

ХЕПЕЛЬ®
(HEPEEL®)

Торговое название препарата
Хепель®

Лекарственная форма
Таблетки для рассасывания гомеопатические

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от «15» 12 2017 г. № 1454
КЛС № 13 от «30» 11 2017

Описание:

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы, с фаской, от белого до бежево-, оранжево-, или розовато-белого цвета, иногда с отдельными точечными вкраплениями розового или оранжевого цвета. Запах практически отсутствует.

Состав (на 1 таблетку)

Активные вещества:

| | | |
|------------------------------------------------|----|-------|
| Chelidonium majus Чистотел большой | D4 | 30 мг |
| Cinchona pubescens Хинное дерево | D3 | 30 мг |
| Citrullus colocynthis Колоцинт обыкновенный | D6 | 90 мг |
| Lycopodium clavatum Плаун булавовидный | D3 | 30 мг |
| Myristica fragrans Мускатный орех | D4 | 30 мг |
| Phosphorus Фосфор | D6 | 15 мг |
| Silybum marianum Расторопша пятнистая | D2 | 15 мг |
| Veratrum album Чемерица белая | D6 | 60 мг |

Вспомогательные вещества:


Магния стеарат 1,5 мг,
Лактоза до получения таблетки массой около 0,302 г.

Фармакотерапевтическая группа Прочие лекарственные средства

Фармакологические свойства Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав. Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

НД РБ

2528 - 2017

**Область применения**

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических показаний. Применяется в комплексной терапии функциональных нарушений печени.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Известная повышенная чувствительность к расторопше пятнистой (*Silybum marianum*) или иным растениям семейства сложноцветных, а также в случае гиперчувствительности к хинину. Беременность и период грудного вскармливания в связи с наличием в составе чистотела и чемерицы. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Способ применения и дозы

Если врач не назначил иначе, принимают по 1 таблетке 3 раза в день. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. Продолжительность лечения определяется врачом. Не рекомендуется длительное применение гомеопатических препаратов без консультации с врачом.

Побочное действие

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и сообщить об этом врачу.

В редких случаях при приеме препаратов, содержащих хинин или хинидин, могут возникнуть реакции гиперчувствительности (кожная аллергия или лихорадка). В этих случаях необходимо проконсультироваться с врачом. При приеме препаратов, содержащих алкалоиды чистотела, поступали единичные сведения о повышении показателей функциональной активности печени (трансаминаз) и концентрации билирубина вплоть до обусловленной лекарственными средствами желтухи (медикаментозно-токсический гепатит). Прекращение приема препарата приводит к нормализации этих показателей.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами. В случае применения других лекарственных средств рекомендуется проконсультироваться с врачом.


Меры предосторожности

При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу. При наличии стойких неясных или повторяющихся симптомов, а также в случае камней в желчном пузыре, обтурации желчных протоков, развития желтухи, необходима консультация врача. В том случае, если курс лечения длится более 4 недель необходимо контролировать параметры функции печени. Пациентам с заболеваниями печени и пациентам, принимавшим ранее гепатотоксические средства, перед приемом препарата Хепель необходимо проконсультироваться с врачом. Прием лекарственного средства не заменяет устранение гепатотоксических факторов (например алкоголя).

Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы. При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу

НД РБ

2528 - 2017



Беречь от влаги!

Пенал закрывать сразу после применения препарата.

Применение при беременности и лактации

Лекарственное средство противопоказано в период беременности и лактации в связи с наличием в составе чистотела и чемерицы.

Влияние на способность управлять автотранспортом и другими механизмами:

Отсутствуют данные о влиянии на способность выполнять потенциально опасные виды деятельности, требующие особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.)

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания гомеопатические. Упакованы по 50 таблеток в белые пеналы из полипропилена с крышками из полипропилена. На каждый пенал наклеивают этикетку. Каждый пенал вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности:

5 лет.

Не применять по истечении срока годности указанного на упаковке!

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15°C до 25°C,
Хранить в местах, недоступных для детей!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хель ГмбХ
Доктор-Рекевег-штрассе 2-4,
Д-76532 Баден-Баден, Германия

Организация, уполномоченная на принятие претензий в Республике Беларусь

УП Белнико
220123 г. Минск
Ул. В. Хоружей 22 оф. 1405
Тел. +375 17 283 17 38
E-mail direct@belnico.by
Сайт www.belnico.by