



НД ГБ 5387 2015

**Листок-вкладыш**

(информация для потребителей)

**МУКАЛТИН**

**Название лекарственного средства (международное непатентованное или группировочное название):** отсутствует

**Лекарственная форма:** таблетки

**Краткая характеристика готовой лекарственной формы:** таблетки от светло-серого до коричневатого-серого цвета с вкраплениями более светлого и более темного цвета, со специфическим запахом, плоскоцилиндрические, с риской и фаской.

**Состав на 1 таблетку:**

*активное вещество:* мукалтин экстракт сухой (сухой экстракт травы алтея лекарственного с содержанием полисахаридов в пересчете на глюкозу не менее 18 %) – 50 мг;

*вспомогательные вещества:* натрия гидрокарбонат, винная кислота, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский), кальция стеарат.

**Фармакотерапевтическая группа:** отхаркивающие средства

Код АТХ [R05CA].

**Фармакологические свойства:** Мукалтин представляет собой смесь полисахаридов из травы алтея лекарственного. Лекарственное средство обладает обволакивающими и отхаркивающими свойствами.

**Показания к применению:** В комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем.

**Противопоказания:** повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, детский возраст до 12 лет.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Мукалтин не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

**Влияние на способность управлять автомобилем или механизмами:** Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились. **Способ применения и дозировка:** взрослым и детям от 12 лет внутрь 1-2 таблетки 2-3 раза в день перед едой. Курс лечения в среднем 7-14 дней. Детям можно растворить таблетку в 1/3 стакана теплой воды.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

**Особые указания**

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются нарушения дыхания, появляется кашель с гнойной мокротой), необходимо обратиться к врачу.

**Передозировка:** до настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

**Побочное действие:** аллергические реакции, диспепсические явления.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в инструкции по применению, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Условия хранения:** Хранить в защищенном от влаги месте, при температуре от 8 °С до 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 2 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска:** Без рецепта.

**Упаковка:** по 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку. Контурные безъячейковые упаковки помещают непосредственно в групповую упаковку.

**Информация о производителе:**

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", 305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18,  
тел./факс: (4712) 34-03-13, [www.pharmstd.ru](http://www.pharmstd.ru)

