


8327 - 2016

ИНСТРУКЦИЯ

(листок-вкладыш)



14.11.2016 № 1248
14.11.2016

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

МЕТИЛУРАЦИЛ

- *Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш перед тем, как начать использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.*
- *Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.*
- *Если у Вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.*

Торговое название препарата: Метилурацил

Международное непатентованное название: отсутствует

Лекарственная форма: мазь для местного и наружного применения

Состав

1 г мази содержит:

действующее вещество:

диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) – 100 мг;

вспомогательные вещества: вазелин - 450 мг, ланолин – 315 мг, вода очищенная – 135 мг.

Описание: Мазь от белого с желтоватым оттенком до светло-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие ранозаживляющие средства.

Код АТХ: D03AX

Фармакологические свойства

Обладает анаболической и антикатаболической активностью, ускоряет процессы клеточной регенерации.

Показания к применению

Вялозаживающие раны, вялозаживающие эрозии и язвы кожи, трещины кожи заднего прохода и молочных желез, ожоги (термические, химические, лучевые), буллезные дерматиты. Метилурацил может использоваться с



8327 - 2016

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

профилактической целью для предупреждения ~~реакций~~ ~~кожи~~ ~~при~~ ~~облучении~~ новообразований с невысокой радиочувствительностью, уменьшения радиопителиита и поздних сращений стенок (окклюзий) влагалища – в случае лучевой терапии новообразований гениталий.

Способ применения и дозы

Наружно. Местно.

Мазь наносят на поврежденные участки тонким слоем в количестве 5-20 г ежедневно в течение 15-30 дней. При эрозиях, язвах и ранах мазь наносят после предварительной обработки антисептиками. Мазь используется в рыхлых тампонах для лечения радиопителиита и поздних лучевых повреждений влагалища.

Длительность лечения определяется врачом с учётом особенностей заболевания,

переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Побочное действие

Аллергические реакции в виде зуда, гиперемии и кратковременного жжения.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, избыточность грануляций в ране. Острые и хронические лейкозы, другие злокачественные заболевания системы органов кроветворения.

Передозировка

Случаи передозировки препарата Метилурацил, мазь для местного и наружного применения, не описаны. Возможно изменение состава периферической крови при длительном применении мази в больших дозах.

Меры предосторожности

С осторожностью использовать при кожных заболеваниях, сопровождающихся образованием избыточных разрастаний ткани.



8327 - 2016

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

вегетирующей пузырьчатке, вегетирующей пиодермии, веррукозной форме эпидермодисплазии и др. Лекарственное средство следует применять с осторожностью при острых воспалительных заболеваниях кожи и в период обострения хронических, на большие по площади участки кожи – при нарушениях обмена холестерина и тяжелых заболеваниях печени.

Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, прекратите применение лекарственного средства и обратитесь к врачу.

Применение в период беременности и лактации

Применение при беременности и в период лактации рекомендуется проводить под контролем врача, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Применение у детей

Эффективность и безопасность применения лекарственного средства у детей до 18 лет не установлена.

Влияние на способность управлять автотранспортом или другими механизмами

Не влияет на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат совместим с наружными аппликациями антибактериальных и антисептических средств.

Одновременное местное применение глюкокортикоидов ослабляет эффект мази.


Форма выпуска

Метилурацил, мазь для местного и наружного применения 10%. По 25 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.


Условия хранения

Хранить при температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.



8327 - 2016



Срок годности

3 года 6 мес. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/ Организация, принимающая претензии

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород

ГСП-459, ул. Салганская, д.7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru

