

Листок вкладыш
Информация для пациентов

Антисептик для полости рта и горла
Без сахара

Септолете® Д Ментол таблетки для рассасывания, покрытые оболочкой 1 мг

Торговое название

Септолете® Д Ментол (Septolete® D Menthol)

Международное непатентованное название

Бензалконий (Benzalkonium)

Лекарственная форма

Таблетки для рассасывания, покрытые оболочкой

Общая характеристика

Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки для рассасывания, покрытые оболочкой желтого цвета.

Состав

Каждая таблетка для рассасывания, покрытая оболочкой, содержит 1 мг бензалкония хлорида.

Вспомогательные вещества: мальтит жидкий, маннит, тимол, левоментол, мяты перечной масло, эвкалиптовое масло, касторовое масло чистое, глицерин, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, повидон К 25, краситель хинолиновый желтый, титана диоксид, капол 600 Фарма, мальтит.

Код классификации лекарственного средства


Антисептики. Препараты для лечения заболеваний горла. Код АТХ R02AA16.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Бензалкония хлорид является антисептиком из группы четвертичных соединений аммония, действует как катионоактивный детергент. Четвертичные аммониевые соединения связываются с цитоплазматической мембраной микроорганизма, тем самым увеличивая проницаемость цитоплазматической мембраны. Таким образом, бензалкония хлорид оказывает бактерицидное действие на грамположительные, грамотрицательные бактерии и на *Candida albicans*.

Фармакокинетика



3917-2016

НДРБ

Не имеется данных по фармакокинетике лекарственного средства Септолете Д Ментол.

В научной литературе не приводятся данные по фармакокинетике бензалкония хлорида.

Известно, что четвертичные аммониевые соединения плохо всасываются, и в основном выводится в неизменном виде с калом.

Показания для применения

Таблетки для рассасывания Септолете Д Ментол рекомендованы для облегчения симптомов:

- при легких инфекциях полости рта и горла;
- при простуде и гриппе (боль, сухость, жжение и раздражение горла);
- при воспалении десен и слизистой оболочки полости рта;
- при охриплости голоса и неприятном запахе изо рта

Способ применения и дозировка

Рекомендуемая доза для детей 4 – 10 лет составляет до 4 таблеток в сутки. Детям в возрасте 10 – 12 лет рекомендуется принимать до 6 таблеток в сутки. Рекомендуемая доза для взрослых и детей старше 12 лет составляет до 8 таблеток в сутки.

Рассасывать по 1 таблетке каждые 2 - 3 часа.

Опыт применения у детей ограничен. Препарат не рекомендуется принимать детям младше 4-х лет.

Таблетки для рассасывания не должны приниматься непосредственно перед едой или во время еды. Таблетки не следует запивать молоком, так как оно снижает противомикробную эффективность бензалкония хлорида.

Побочное действие

Как и все препараты таблетки для рассасывания Септолете Д Ментол в отдельных случаях могут вызывать нежелательные явления.

В очень редких случаях (<1/10,000) возможны:

- Тошнота, рвота, диарея, боль в животе. Указанные симптомы проявляются, как правило, у людей с повышенной чувствительностью при превышении рекомендованных доз.

- Реакции гиперчувствительности.

В случае возникновения описанных побочных реакций, а также при появлении побочной реакции, не упомянутой в листке-вкладыше, пожалуйста, сообщите о них Вашему врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к бензалкония хлориду или иным компонентам лекарственного средства.

Передозировка

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Учитывая количество действующих веществ в каждой таблетке, передозировка практически невозможна.

При передозировке могут возникать нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота и диарея). Высокие дозы полиолов могут вызвать диарею, особенно у детей.

В случае возникновения таких симптомов следует прекратить прием препарата.

Меры предосторожности

Пациентам с хроническим кашлем или охриплостью следует проконсультироваться с врачом.

При более тяжелых инфекциях, сопровождающихся высокой температурой, головной болью и рвотой, в случаях, если состояние не улучшается в течение трех дней, следует проконсультироваться с врачом.

Септолете Д Ментол не рекомендуется принимать детям младше 4 лет.

Пациентам с сахарным диабетом следует помнить, что каждая таблетка для рассасывания содержит порядка 0,9 г мальтита. Для метаболизма мальтита требуется инсулин, однако, из-за медленного гидролиза и плохого всасывания в желудочно-кишечном тракте гликемический индекс мальтита низкий. Энергетическая ценность мальтита (10 кДж/г или 2,4 ккал/г) значительно ниже, чем у сахарозы.

Особые предупреждения о некоторых ингредиентах лекарственного средства

Таблетки для рассасывания Септолете Д Ментол содержат мальтит и жидкий мальтит. Пациенты с редкими наследственными нарушениями, связанными с непереносимостью фруктозы, не должны принимать препарат.

Беременность и лактация

Перед приемом каких-либо препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.

Так как данные по безопасности применения препарата этой категорией пациентов ограничены, не рекомендуется применять Септолете Д Ментол во время беременности и в период кормления грудью без консультации специалиста.

Влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами

Не сообщалось о влиянии Септолете Д Ментол на способность управлять автотранспортными средствами и другими механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

О взаимодействии Септолете Д Ментол с другими лекарственными средствами данных нет.

Бензалкония хлорид несовместим с анионными ПАВ, цитратами, иодидами и салицилатами. Бензалкония хлорид несовместим с перманганатом, перекисью водорода.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Условия и срок хранения

Хранить при температуре не выше 25 С.

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от влаги месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 3 года.

Не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Упаковка

30 таблеток для рассасывания в блистерах (2 блистера по 15 таблеток для рассасывания) в картонной коробке вместе с листком-вкладышем.

Производитель

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения.

