

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

## ГАЛСТЕНА® (GALSTENA)®

Гомеопатическое лекарственное средство.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

**Торговое название:** Галстена®


**Лекарственная форма:** капли для приема внутрь.

**Состав:** в 1 мл содержится:

*активные вещества:* Расторопша пятнистая (*Silybum marianum*) D1 0,02 мл, Одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*) D6 0,1 мл, Чистотел большой (*Chelidonium majus*) D6 0,1 мл, Сульфат натрия (*Natrium sulfuricum*) D12 0,1 мл, Фосфор (*Phosphorus*) D12 0,1 мл,

*вспомогательные вещества:* содержит этанола не менее 41,5%.

(1 мл = приблизительно 25 капель)



**Описание лекарственной формы:** прозрачная от бесцветного до слегка желтоватого цвета жидкость без специфического запаха.

**Фармакотерапевтическая группа:** прочие лекарственные средства.

**МНН:** отсутствует.

**Код АТХ:** V03AX

#### Фармакологические свойства

Галстена® представляет собой гомеопатическое лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

**Область применения:** Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется в комплексной терапии при функциональных нарушениях пищеварения (диспепсия, метеоризм).

Применение по указанному назначению основывается только на опыте применения.

**Противопоказания:** повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как ромашка, арника, амброзия, тысячелистник, пижма, полынь, астра, хризантема.

**Способ применения и дозы:** препарат Галстена® следует принимать за 30 минут до или через 1 час после приема пищи. Гомеопатическое средство может быть принято в неразбавленном виде или разведенным в небольшом количестве воды (1 столовая ложка). В начале лечения гомеопатическое средство назначают по 10 капель каждые полчаса-час (не более 4 раз в сутки). После уменьшения выраженности симптомов частоту приема необходимо снизить до 3 раз в сутки.

*Длительность курса лечения*

Продолжительность применения лекарственного средства. Если во время применения препарата симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

*Применение у детей:* применение гомеопатического средства Галстена® не рекомендовано для детей до 18 лет в связи с отсутствием достаточных данных.

**Побочное действие:** возможно развитие аллергических реакций, легких желудочно-кишечных расстройств (сухость во рту, тошнота, диарея).

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Передозировка:** лекарственное средство содержит не менее 41,5% этилового спирта. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:** клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено. В случае приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Особые указания:** перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Если во время применения препарата симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

В начале лечения гомеопатическими лекарственными средствами возможно временное ухудшение симптомов заболевания. В случае ухудшения состояния прием гомеопатического лекарственного средства следует прекратить и обратиться к врачу.

Действие гомеопатического средства может уменьшиться при курении или под влиянием других вредных привычек (например, алкоголя).

В случае продолжительного приема гомеопатического средства необходимо наблюдение врача, специализирующегося на гомеопатическом методе лечения, поскольку возможно возникновение нежелательных симптомов.

В разовой дозе препарата Галстена® (10 капель) содержится 160 мг этилового спирта, поэтому данное средство не следует принимать лицам с алкогольной зависимостью, эпилепсией, пациентам с заболеваниями печени, головного мозга, беременным и кормящим грудью женщинам, детям.

*Применение у детей:* применение гомеопатического средства Галстена® не рекомендовано для детей до 18 лет в связи с отсутствием достаточных данных.

**Беременность и кормление грудью:** В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта гомеопатическое средство противопоказано принимать во время беременности и кормления грудью.

**Влияние на способность управлять транспортным средством и работу с механизмами:** лекарственное средство содержит этиловый спирт. Во время приема лекарственного средства не рекомендовано вождение автомобиля и работа с движущимися механизмами.

**Форма выпуска:** капли для приема внутрь по 20 мл и 50 мл во флаконах из коричневого стекла с навинчивающейся крышкой из пропилена, с капельницей из полиэтилена. Каждый флакон помещают вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

3991 - 2016

**Условия хранения:** хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°C.

**Срок хранения:** 5 лет.

Не применять по истечении срока годности

**Условия отпуска из аптек:** без рецепта.

**Производитель:**

«Рихард Биттнер АГ», Райснерштрассе 55-57, А-1030, Вена, Австрия.

