

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

ПУМПАН® (PUMPAN)®

Гомеопатическое лекарственное средство.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.


Торговое название препарата: Пумпан®

Лекарственная форма: капли для приема внутрь.

Состав: в 1 мл содержится:

активные вещества: Боярышник (Crataegus) D1 0,2 мл, Арника горная (Arnica) D6 0,1 мл, Калия карбонат (Kalium carbonicum) D6 0,1 мл, Наперстянка пурпурная (Digitalis) D12 0,1 мл, Ландыш майский (Convallaria) D12 0,1мл

вспомогательные вещества: содержит этианола не менее 41,5%.
(1 мл = приблизительно 25 капель).



Описание: прозрачная от желтоватого до красновато-желтого цвета жидкость без специфического запаха.

Фармакотерапевтическая группа: прочие лекарственные средства.

МНН: отсутствует.

Код ATХ: V03AX

Фармакологические свойства

Пумпан® представляет собой гомеопатическое лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Область применения: Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется в комплексной терапии пациентов с функциональными нарушениями сердечной деятельности.

Применение по указанному назначению основывается только на опыте применения.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также растениям семейства сложноцветных, таким как, ромашка, календула, хризантема.

Способ применения и дозы: препарат Пумпан® следует принимать за 30 минут до или через 1 час после приема пищи. Гомеопатическое средство может быть принято в неразбавленном виде или разведенным в небольшом количестве воды (1 столовая ложка). В начале лечения гомеопатическое средство назначают по 10 капель каждые полчаса-час (не более 8 раз в сутки). После уменьшения выраженности симптомов частоту приема необходимо снизить до 2-3 раз в сутки, в последующем частоту приема следует уменьшить до одного раза в сутки.

Длительность курса лечения

Продолжительность применения лекарственного средства время применения препарата симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Применение у детей: применение гомеопатического средства Пумпан[®] не рекомендовано для детей до 18 лет.

Побочное действие: возможно развитие аллергических реакций, возникновение тахиаритмий и брадиаритмий. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка: лекарственное средство содержит не менее 41,5% этилового спирта. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

Клинически значимое взаимодействие с другими лекарственными средствами не установлено. В случае приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом. Одновременный прием гомеопатического средства Пумпан[®] и других лекарственных средств, применяемых для лечения заболеваний сердца, необходимо осуществлять под наблюдением врача.

Особые указания: перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Гомеопатическое средство Пумпан[®] не рекомендовано пациентам с нарушением ритма сердца, а также аритмиями в анамнезе, вызванными приемом сердечных гликозидов.

Во время лечения необходимо наблюдение врача, контроль артериального давления и ЭКГ. Существует риск суправентрикулярных и желудочковых экстрасистолий, а также других нарушений сердечного ритма.

Если во время применения препарата симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Необходима немедленная медицинская помощь при возникновении боли в области сердца с иррадиацией в руку, верхнюю часть живота, шею, или в случае развития дыхательной недостаточности.

В начале лечения гомеопатическими лекарственными средствами возможно временное ухудшение симптомов заболевания. В случае ухудшения состояния прием гомеопатического лекарственного средства следует прекратить и обратиться к врачу.

Действие гомеопатического средства может уменьшиться при курении или под влиянием других вредных привычек (например, алкоголя).

В случае продолжительного приема гомеопатического средства необходимо наблюдение врача, специализирующегося на гомеопатическом методе лечения, поскольку возможно возникновение нежелательных симптомов.

В разовой дозе препарата Пумпан[®] (10 капель) содержится 160 мг этилового спирта, поэтому данное средство не следует принимать лицам с алкогольной зависимостью, эпилепсией, пациентам с заболеваниями печени, головного мозга, беременным и кормящим грудью женщинам, детям.

Применение у детей: применение гомеопатического средства Пумпан[®] не рекомендовано для детей до 18 лет.

Беременность и кормление грудью: гомеопатическое средство противопоказано для приема женщинам во время беременности и кормления грудью.

Влияние на способность управлять транспортным средством и работу с механизмами: лекарственное средство содержит этиловый спирт. Во время приема

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь № 10 от 10.01.2016 г.
Если во

НД РБ

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

лекарственного средства не рекомендовано вождение автомобилей с движущимися механизмами.

3995 - 2016

с

Форма выпуска: капли для приема внутрь по 20 мл и 50 мл во флаконах коричневого стекла с навинчивающейся крышкой из пропилена, с капельницей из полиэтилена. Каждый флакон помещают вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°C.

Срок хранения: 5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек: по рецепту врача.

Производитель: «Рихард Биттнер АГ», Райснерштрассе 55-57, А-1030, Вена, Австрия.