


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

СТОДАЛЬ®, Сироп

Регистрационный номер

Название лекарственного средства
СТОДАЛЬ®

Лекарственная форма
Сироп.



Описание

Сироповидная жидкость, прозрачная или слегка опалесцирующая, слегка желтовато-коричневая, с ароматным запахом бальзама толу.

Состав

На 200 мл флакон:

Активные вещества:

Прострел (Pulsatilla) 6 СН.....	2,375 г
Щавель курчавый (Rumex crispus) 6 СН.....	2,375 г
Переступень (Bryonia) 3 СН.....	2,375 г
Ипекакуана (Ipeca) 3 СН.....	2,375 г
Жженая губка (Spongia tosta) 3 СН.....	2,375 г
Лобария легочная (Sticta pulmonaria) 3 СН.....	2,375 г
Антимониум тартарикум (Antimonium tartaricum) 6 СН.....	2,375 г
Миокард (Myocarde) 6 СН.....	2,375 г
Кошениль (кактусовая тля) (Coccus cacti) 3 СН.....	2,375 г
Росьянка круглолистная (Drosera) МТ.....	2,375 г

Вспомогательные вещества:

Сироп толу, сироп полигала, сироп сахарозы, карамель, бензойная кислота, 96% этанол.

Лекарственное средство содержит 1.74% об/об спирта этилового.

Фармакотерапевтическая группа

У03АХ: Прочие лекарственные препараты. Гомеопатическое лекарственное средство.

Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется для облегчения кашля.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активным компонентам или любому из вспомогательных веществ.

Дети до 2 лет.

Меры предосторожности

Данное лекарственное средство содержит 1.74% об/об спирта этилового.

Каждые 15 мл сиропа содержат 0.206 г этанола и 11.25 г сахарозы.

Каждые 5 мл сиропа содержат 0.069 г этанола и 3.75 г сахарозы.

- Опасно для людей, страдающих от алкоголизма
- Учитывать при назначении беременным и кормящим женщинам, детям и группам высокого риска, например, при заболеваниях печени или при эпилепсии.
- Поскольку средство содержит сахарозу, оно противопоказано при непереносимости фруктозы, синдроме глюкозно-галактозной мальабсорбции и недостаточности сахаразы-изомальтазы (редкие метаболические расстройства)
- При лечении пациентов с сахарным диабетом необходимо учитывать содержание сахарозы.

Если у Вас есть какие-либо дополнительные вопросы, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Вы должны обратиться к врачу, если не чувствуете улучшения или в случае ухудшения через 3 дня после начала приема препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Просьба сообщить врачу или фармацевту, если вы принимаете в настоящее время или недавно принимали любые лекарственные средства, даже отпускаемые не по рецепту, поскольку лекарственные средства могут изменять эффекты друг друга.

Беременность и лактация

В отсутствие экспериментальных и клинических данных, и в качестве меры безопасности, не рекомендуется использовать это лекарственное средство во время беременности и лактации.

Влияние на управление транспортными средствами или потенциально опасными механизмами

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! Рекомендовано соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Важная информация о некоторых компонентах препарата

Этот препарат содержит сахарозу и этанол.

Дозировка и способ применения

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Внутрь.

Взрослым: по 15 мл с помощью мерного колпачка 3-5 раз в день.

Детям в возрасте от 2 лет: по 5 мл с помощью мерного колпачка 3-5 раз в день.

У пациентов с нарушением функции печени применять с осторожностью.

Продолжительность лечения ограничена одной неделей, однако, если спустя 3 дня не наблюдается улучшение, Вам необходимо обратиться у врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Побочное действие

Возможно развитие аллергических реакций.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Условия хранения и срок годности

Срок годности: 5 лет.

Препарат не нуждается в особых условиях хранения.

Хранить препарат в недоступном для детей месте.

Не используйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Упаковка

Коробка с 1 флаконом 200 мл с мерным колпачком.

Информация о производителе (заявителе)

БУАРОН

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

франция

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь