

05.03.2016
M

НП РД 4329 - 2012

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

информация для пациента лекарственного средства

ДОКТОР ТАЙСС ЭКСТРАКТ ЭХИНАЦЕИ

Лекарственная форма

таблетки для рассасывания

Состав:


1 таблетка (2,5 г) содержит:

активные ингредиенты

Экстракт эхинацеи (сухой 3:6:1) 20,0 мг
Ментол 2,0 мг

неактивные ингредиенты

Сахароза	1468,75 мг
Сироп глюкозы	920,25 мг
Ароматизатор из трав	25,00 мг
Ароматизатор из хвои	1,50 мг
Очищенная вода	62,50 мг



Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки с фаской и углубленными центрами светло-коричневого цвета с неравномерным окрашиванием и запахом ментола. Возможно наличие включений пузырьков воздуха, незначительная неровность краев и легкое прилипание к первичной упаковке.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства, применяемые при простудных заболеваниях.
Код ATХ: R05X

Фармакологические свойства

Механизм действия не установлен.

Показания к применению

Кратковременная профилактика и лечение в составе комплексной терапии острых респираторных заболеваний.

Противопоказания

- состояния иммунодефицита и иммунносупрессии
- повышенная чувствительность к действующему веществу или к растениям семейства сложноцветных, ментолу, к любому из вспомогательных веществ
- прогрессирующие системные и аутоиммунные заболевания, в т.ч. туберкулез, саркоидоз, системные заболевания соединительной ткани (коллагенозы)
- рассеянный склероз
- СПИД и ВИЧ-инфекция
- злокачественные

*Согласовано
01.04.2016. А.Усеко / Чулко А.Р./
А.Усеко*

заболевания

- патология системы лейкоцитов (гемобластозы, агранулоцитоз и др.)
- прием иммунодепрессантов
- склонность к аллергическим реакциям
- беременность, период лактации
- детский возраст до 12 лет

Применение при беременности и лактации

Не рекомендуется назначать женщинам во время беременности и в период лактации, поскольку безопасность препарата в этих случаях не изучена.

**Применение у детей**

Применение лекарственного средства у детей до 12 лет не рекомендуется в связи с отсутствием достаточных данных.

Способ применения и дозы

Взрослые и подростки старше 12 лет по 1 таблетке 3-4 раза в день. Держать во рту до полного рассасывания. При лечении простудных заболеваний следует начинать прием препарата при первых признаках заболевания. Для профилактики и лечения простудных заболеваний препарат не следует использовать более 10 дней.

Для проведения повторных курсов лечения необходима консультация врача.

Меры предосторожности

1 таблетка содержит 920,25 мг глюкозы и 1468,75 мг сахарозы в одной таблетке, что соответствует 0,2 ХЕ. Необходимо принимать во внимание при назначении лекарственного средства пациентам с сахарным диабетом.

В связи с содержанием сахарозы и глюкозы не следует принимать данное лекарственное средство пациентам с непереносимостью фруктозы, мальабсорбией глюкозо-галактозы или недостаточностью сахаразы-изомальтазы.

Может вызвать повреждение зубов при длительном применении (2 недели и более).

В связи с содержанием ментола лекарственное средство не рекомендовано пациентам с изжогой, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, воспалительными и язвенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Побочное действие

Аллергические реакции (гиперемия кожи, крапивница, сыпь, зуд, отек лица, одышка), головокружение, снижение артериального давления. В редких случаях возможно развитие тяжелых реакций гиперчувствительности: ангионевротический отек, анафилактический шок, бронхоспазм с обструкцией, приступ бронхиальной астмы, синдрома Стивенса-Джонсона.

При продолжительном приеме (более 8 недель) может развиться лейкопения.

Эхинацея может вызвать развитие аллергических реакций у пациентов с атопией.

Были сообщения о связи приема эхинацеи с развитием аутоиммунных заболеваний (рассеянный энцефалит, узловая эритема, тромбоцитопения иммунного характера, синдром Эванса, синдром Шегрена с дисфункцией почечных канальцев).

В связи с содержанием ментола возможны местные реакции гиперчувствительности, сопровождающиеся жжением, образованием язв и лихеноидными реакциями. Аллергические реакции на ментол также могут сопровождаться головной болью, брадикардией, tremором, атаксией, анафилактическим шоком и эритематозной кожной сыпью.

В случае появления побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

4329 - 2012

НП РБ

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Данные о взаимодействиях с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами

Исследования по оценке влияния эхинацеи на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

Передозировка

Данные о случаях передозировки отсутствуют.

В связи с содержанием ментола в случаях передозировки возможны желудочно-кишечные расстройства, диарея, образование ректальных язв, эпилептические судороги, потеря сознания, апноэ, тошнота, нарушение сердечного ритма, атаксия и другие нарушения со стороны центральной нервной системы.

В случае передозировки рекомендовано обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Упаковка

Таблетки для рассасывания. По 12 таблеток в блистере из пленки ПВХ и алюминиевой фольги. По 1 или 2 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности

Условия отпуска

Без рецепта .

Название и адрес производителя

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ Мишелинштрассе 10, 66424 Хомбург, Германия
Тел. 06841-709-151, Факс 06841-709-153

Представительство в Республике Беларусь:

ИООО «НАТУСАНА»

220140 Минск, ул. Лещинского 8/4-1

Тел/факс (017) 256-55-45

Согласовано

01.04.2016г. Альберт/Чукко А.В./

Альберт