



экстракт жидкий для перорального применения, спиртовой

## Листок-вкладыш. Информация для пациента

Прочтите внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата!

Храните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его снова.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

### Состав лекарственного средства:

**основные физико-химические свойства:** жидкость зеленовато-бурого цвета, ароматного запаха. С равным объемом воды образует муть. В процессе хранения возможно выпадение осадка;

**международное непатентованное название:** отсутствует;

**действующее вещество:** экстракт жидкий из травы водяного перца (1:1) – 25 мл;

**вспомогательное вещество:** спирт этиловый 70 %.

**Лекарственная форма.** Экстракт жидкий для перорального применения, спиртовой.

**Фармакотерапевтическая группа.** Гемостатическое, кровоостанавливающее средство растительного происхождения. Код АТС B02BX.

### Фармакологические свойства.

**Фармакодинамика.** Биофлавоноиды, содержащиеся в водяном перце (рутин, кверцетин, гиперозид, рамнозин, кемпоферол, мирицетин, лютеолин), проявляют Р-витаминную активность, уменьшают проницаемость капилляров, нормализуют структуру сосудистой стенки, предохраняют от окисления аскорбиновую кислоту, содержащуюся в водяном перце. Совместно с аскорбиновой кислотой участвуют в окислительно-восстановительных реакциях, снижают активность гиалуронидазы. Дубильные вещества проявляют противовоспалительное и вяжущее действие. Оказывают синергический эффект с биофлавоноидами по кровоостанавливающему действию.

**Фармакокинетика.** Максимальное фармакологическое действие биофлавоноидов перца водяного достигается за счет экстракции 70% этиловым спиртом. При данной концентрации в нем растворяются флавоноиды, находящиеся как в свободной (агликон), так и в связанной (с гликозидной частью) форме. Этим достигается максимальное всасывание основных действующих веществ через микроворсинки ЖКТ в кровь. После прохождения окислительно-восстановительных реакций с участием флавоноидов они подвергаются гидролизу на агликон и гликозид. Первый выделяется почками с мочой и через кишечник с желчью, последний (углеводный остаток) либо окисляется в цикле Кребса до двуокиси углерода и воды, либо депонируется в виде гликогена в организме.

**Показания к применению.** Препарат применяют как вспомогательное средство в акушерско-гинекологической практике при маточных послеродовых кровотечениях, при субинволюции матки, гипermenорагии. Кроме того, применяют при кровотечениях из мелких сосудов желудка, кишечника, при несильных геморроидальных кровотечениях.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Возможно снижение эффективности антикоагулянта Варфарина при одновременном использовании с препаратами Водяного перца. Может потребоваться коррекция дозы Варфарина и контроль показателей коагулограммы.

*Если Вы принимаете любые другие лекарственные средства, обязательно сообщите об этом врачу!*

**Меры предосторожности.** Не применять вместе с молочной пищей для предотвращения образования невсасываемых (хелатных) комплексов с активными веществами.

**Применение в период беременности или кормления грудью.** Вопрос о назначении препарата в период беременности или кормления грудью решается индивидуально с учетом соотношения польза/риска.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.** Поскольку в составе препарата содержится этанол, не рекомендуется применять Водяного перца экстракт во время управления автотранспортом и проведения работ с применением потенциально опасных механических устройств.

**Дети.** Не применять детям в возрасте до 12 лет из-за содержания этанола.

**Способ применения и дозировка.** Водяного перца экстракт взрослые и дети старше 12 лет принимают по 30 – 40 капель 3 – 4 раза в день (за полчаса до еды). Курс лечения зависит от характера и тяжести заболевания, достигнутого эффекта, характера комплексной терапии.

**Передозировка.** В случае передозировки лечение симптоматическое.

**Побочные эффекты.** Головная боль, тошнота, рвота, головокружение; в отдельных случаях возможны аллергические реакции, в том числе кожная сыпь, покраснение, зуд.

**Срок годности препарата.** Срок годности – 3 года 6 месяцев.

**Нельзя применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке!**

**Условия хранения.** Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. В процессе хранения возможно выпадение осадка. Перед применением взболтать.

**Хранить в недоступном для детей месте!**

**Упаковка.** По 25 мл во флаконе стеклянном, помещенном в пачку из картона, в которую дополнительно вкладывают пробку-капельницу.

**Правила отпуска.** Без рецепта.

**Название и адрес производителя.**

ООО "Тернофарм".

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4;  
тел./факс (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>