


1994

НД РБ

67 46 - 2017

**ИХТИОЛ***Ichthyol*

Суппозитории ректальные
для взрослых

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Прочтите внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем начать применение препарата!

Сохраняйте этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Этот препарат предназначен лично Вам, и не следует передавать его другим лицам. Это может навредить им, даже если симптомы их заболевания схожи с теми, которые наблюдаются у Вас.

Торговое название: Ихтиол

Международное непатентованное название: Ихтаммол

Лекарственная форма: суппозитории ректальные.

Описание: суппозитории темно-бурого цвета с запахом ихтиола; допускается появление белого налета на поверхности суппозитория.

Состав лекарственного средства:

1 суппозиторий содержит:

действующее вещество: ихтиол 0,2 г;

вспомогательное вещество: твердый жир.

Фармакотерапевтическая группа.

Прочие средства лечения геморроя и анальных трещин местного применения.

Фармакологические свойства. Ихтиол содержит до 10,5 % серы в виде органических соединений, чем обусловлено его антисептическое, противовоспалительное и обезболивающее действие.

Показания к применению.

В комплексной терапии геморроя.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата. Детский возраст до 18 лет.

Передозировка.

Не описана.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Если Вы принимаете какие-нибудь другие лекарственные средства, обязательно проконсультируйтесь с врачом относительно возможности применения препарата.

Взаимодействие препарата Ихтиол в виде суппозитория с другими лекарственными средствами не описаны.

Меры предосторожности.

Перед началом лечения посоветуйтесь с врачом! Без консультации врача не применяйте препарат дольше установленного срока! Если признаки болезни не начнут исчезать или же, наоборот, состояние здоровья ухудшится, или обнаружатся нежелательные явления, обратитесь к врачу за консультацией по поводу дальнейшего применения препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат можно применять в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода (ребенка).

Влияние на способность управлять автотранспортом или другими механизмами. Данные отсутствуют.

Дети. Применяют детям в возрасте от 18 лет.

Способ применения и дозы.

Назначают взрослым и детям в возрасте от 18 лет. Вводят ректально по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки после очистительной клизмы или обычного акта дефекации. Курс лечения 7-14 дней. При рецидиве заболевания курс лечения повторяют.

Побочное действие.

Аллергические реакции в виде зуда, кожной сыпи. В случае выявления нежелательных влияний или других необычных реакций проконсультируйтесь с врачом по поводу дальнейшего применения препарата.

Срок годности.

Срок годности препарата - 2 года.

Не применяйте препарат после окончания срока годности, который указан на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света, при температуре от 8 °С до 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 5 суппозитория в стрипах. По 2 стрипа вместе с листком-вкладышем в пачке.

Условия отпуска.

Без рецепта.

Название и адрес производителя.

ПАО "Монфарм". Украина, 19100 Черкасская обл., г. Монастырище, ул. Заводская, 8