


6748 - 2018

**НИСТАТИН***Nystatin*Суппозитории ректальные  
250 000 ЕД, 500 000 ЕД**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА**

Прочтите внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата!

Сохраняйте этот листок-вкладыш. Вам может понадобится перечитать его.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Этот препарат назначается лично Вам, и не следует рекомендовать его другим. Это может причинить им вред, даже если симптомы их болезни похожи на те, которые наблюдаются у Вас.

**Торговое название:** Нистатин.

**Международное и химическое названия:** nystatinum; 19 – микозаминилнистатинолид.

**Лекарственная форма:** суппозитории ректальные.

**Описание:** суппозитории желтого или желтовато-коричневого цвета, со слабым специфическим запахом.

**Состав лекарственного средства:**

1 суппозиторий содержит:

*действующее вещество:* нистатина 250 000 ЕД или 500 000 ЕД;

*вспомогательные вещества:* бутилоксанизол, бутилокситолуол, кислота лимонная, масло вазелиновое, твердый жир.

**Фармакотерапевтическая группа.**

*Кишечные противомикробные средства. Антибиотики.*

*Фармакологические свойства.* Имеет в структуре большое количество двойных связей, обуславливающих высокую тропность вещества к стеринным образованиям цитоплазматической мембраны грибов. Вследствие этого молекула встраивается в мембрану клетки с образованием множества каналов, способствующих неконтролируемому транспорту воды, электролитов и неэлектролитов. Клетка теряет устойчивость к воздействию внешних осмотических сил и лизируется. Активен в отношении дрожжеподобных грибов рода *Candida* и аспергилл. Оказывает фунгистатическое, а в больших дозах – фунгицидное действие.


**Показания.**

Для лечения кандидоза прямой кишки. Профилактика грибковых поражений прямой кишки в до- и послеоперационный периоды при хирургических вмешательствах.

**Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к препарату, нарушение функции печени, панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной.

Детский возраст до 18 лет (отсутствуют данные об эффективности и безопасности применения нистатина в ректальной лекарственной форме у детей).

**Предостережения при применении.**

Без консультации врача не применяйте препарат больше установленного срока. Если признаки болезни не начнут исчезать или же, наоборот, состояние здоровья ухудшится или обнаружатся нежелательные явления, обратитесь к врачу за консультацией по поводу дальнейшего применения препарата.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

Если Вы принимаете какие-нибудь другие лекарственные средства, обязательно поставьте в известность врача.

При одновременном применении Нистатина с клотримазолом активность последнего уменьшается.

**Особые указания.**

Перед началом лечения проконсультируйтесь с врачом!

При развитии местного раздражения или аллергической реакции Нистатин следует отменить.

**Применение в период беременности или кормления грудью.**

Назначение нистатина в при беременности возможно в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Хотя препарат всасывается в незначительном количестве, неизвестно, выделяется ли он с грудным молоком, поэтому при необходимости назначения нистатина в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.**

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работу со сложными механизмами.

**Дети.** Лекарственное средство противопоказано детям до 18 лет.

**Способ применения и дозы.**

Суппозитории вводят в прямую кишку после самопроизвольного опорожнения кишечника или очистительной клизмы.

Взрослым назначают по 1 суппозиторию (500 000 ЕД) 2 раза в сутки или по 1 суппозиторию (250 000 ЕД) 4 раза в сутки. Максимальная суточная доза – 1 000 000 ЕД (2 суппозитория по 500 000 ЕД или 4 суппозитория по 250 000 ЕД). Длительность применения составляет 10–14 дней. При профилактике грибковых поражений прямой кишки в до- и послеоперационный периоды при хирургических вмешательствах курс лечения – 7 дней.

При необходимости курс повторяют через 2–3 недели. Длительность лечения и необходимость повторных курсов определяет врач в зависимости от тяжести заболевания.

**Побочное действие.**

Нистатин, как правило побочных реакций не вызывает, но при повышенной чувствительности к нему возможны следующие побочные реакции:

со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея;

со стороны иммунной системы: повышение температуры тела, озноб, аллергические реакции, включая сыпь на коже, зуд, крапивницу;

реакции в месте введения могут проявляться, например, жжением, болью, ощущением зуда, покалыванием или раздражением;

другое: возможен риск распространения резистентных форм грибов, что требует отмены препарата и изменения тактики лечения.

НД РБ

67 48 - 20 18



**Срок годности.**

2 года. *Не применяйте препарат после окончания срока годности, который указан на упаковке.*

**Условия хранения.**

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 8 °С до 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка.**

По 5 суппозиторияв в стрипе. По 2 стрипа вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

**Правила отпуска.** По рецепту врача.

**Название и адрес производителя.**

ПАО "Монфарм". Украина, 19100 Черкасская обл., г. Монастырище, ул. Заводская, 8.