



**Листок-вкладыш
лекарственного средства
АНУЗОЛ-ФАРМАПРИМ
суппозитории ректальные**

Торговое название препарата
АНУЗОЛ-ФАРМАПРИМ

Форма выпуска
Суппозитории ректальные

Общая характеристика

Суппозитории цилиндрической формы, от желто-зеленоватого до светло-коричневого цвета, со специфическим запахом ксероформа, с блестящей и/или матовой поверхностью. Допускается наличие бурых вкраплений.

Состав

1 суппозиторий содержит:

активные вещества: красавки листьев экстракт сухой 30 мг, ксероформ (комплекс трибромфенолята висмута и висмута оксида) 100 мг, цинка сульфат гептагидрат 50 мг;
вспомогательные вещества: глицерин, твердый жир.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства для лечения геморроя и анальных трещин для наружного применения.

Код АТХ: C05AX03

Показания к применению

Геморрой, трещины заднего прохода у взрослых.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- мерцательная аритмия, тахикардия, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, митральный стеноз, тяжёлая артериальная гипертензия;
- острое кровотечение;
- тиреотоксикоз;
- заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся непроходимостью (ахалазия пищевода, стеноз привратника, атония кишечника);
- глаукома;
- миастения gravis;
- доброкачественная гиперплазия предстательной железы, острая задержка мочи;
- язвенный колит в стадии обострения;
- беременность, период лактации;
- детский возраст до 18-ти лет.

Передозировка

Симптомы: усиление проявлений побочных реакций, тошнота, рвота, снижение артериального давления, возбуждение, тремор, судороги, бессонница, сонливость, галлюцинации, раздражительность, гипертермия. Угнетение ЦНС, угнетение активности дыхательного и сосудодвигательного центров, задержка мочеиспускания, гипертермия.

Лечение. Промывание желудка, парентеральное введение холиномиметиков и антихолинэстеразных средств. При гипертермии показаны влажные обтирания и жаропонижающие средства, при возбуждении – введение тиопентала натрия или оксibuтирата натрия при мидриазае – местно в виде глазных капель фосфакол, физостигмин, пилокарпин. В случае развития приступа глаукомы немедленно в конъюнктивальный мешок закапывают 1% раствор пилокарпина каждый час по 2 капли и подкожно вводят 1 мл 0,05% раствора прозерина 3-4 раза в сутки.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

При одновременном применении препарата Анузол-Фармаприм с:

- ингибиторами МАО возможно развитие аритмии сердца;
 - хинидином, новокаинамидом возможен синергизм холинолитического эффекта;
 - препаратами ландыша, с танином возможно физико-химическое взаимодействие и взаимное ослабление эффектов;
 - наркотическими средствами возможно уменьшение продолжительности и глубины воздействия наркотических средств;
 - возможно ослабление анальгетического действия опиатов;
 - при одновременном применении с димедролом или дипразином возможно усиление атропиноподобного действия экстракта беладонны;
 - нитратами, галоперидолом, кортикостероидами для системного применения возможно повышение внутриглазного давления;
 - сертралином возможно усиление депрессивного эффекта обоих препаратов;
 - спиронолактоном, миноксидилом возможно снижение эффективности спиронолактона и миноксидила;
 - пенициллинами возможно усиление эффекта обоих препаратов;
 - низатином возможно потеницирование действия низатидина;
 - кетоконазолом возможно уменьшение всасывания кетоконазола;
 - аскорбиновой кислотой и аттапульгитом возможно снижение действия препарата Анузол-Фармаприм;
 - пилокарпином возможно снижение эффективности пилокарпина при лечении глаукомы;
 - окспренолоном возможно снижение антигипертензивного эффекта препарата.
 - октадином возможно уменьшение гипосекреторного действия экстракта беладонны, который ослабляет действие М-холиномиметиков и антихолинэстеразных средств;
 - сульфаниламидными препаратами возможно поражение почек;
 - препаратами, содержащими калий возможно образование язв кишечника;
 - НПВП возможно образование язв желудка и кровотечений;
 - другими препаратами с антимукарпиновым эффектом: М-холиноблокаторы, противопаркинсоническими препаратами (амантадин), спазмолитиками, некоторыми антигистаминными средствами, препаратами группы бутирофенона, фенотиазина, хинидина и трициклических антидепрессантов, неселективных ингибиторов обратного захвата моноаминов возможно усиление действия препарата Анузол-Фармаприм.
- Угнетение перистальтики под действием Анузол-Фармаприм может привести к изменению всасывания других лекарственных средств.

Меры предосторожности

С осторожностью применять пациентам при следующих заболеваниях и состояниях:

- доброкачественная гиперплазия предстательной железы без обструкции мочевыводящих путей;
- болезнь Дауна;
- детский церебральный паралич;
- рефлюкс-эзофагит;
- грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, сочетающаяся с рефлюкс-эзофагитом;

- неспецифический язвенный колит;
- мегаколон;
- ксеростомия;
- пожилой возраст или ослабленные больные;
- хронические заболевания лёгких, протекающие с низким производством густой мокроты, которая трудно отделяется, особенно у ослабленных больных;
- нейропатии, включая вегетативную (автономную) нейропатию;
- заболевания почек;
- повышение температуры тела (вероятность развития лихорадки и теплового удара вследствие подавления активности потовых желез).

Использование у лиц с нарушенной функцией печени и почек: с осторожностью назначают пациентам с печеночной и/или почечной недостаточностью.

Дети.

Не использовать.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Учитывая возможность появления таких побочных реакций, как головокружение, галлюцинации, нарушение аккомодации, при применении препарата следует воздерживаться от управления автотранспортом или работы с механизмами.

Способ применения и дозы

Ректально, после очистительной клизмы или самостоятельного опорожнения кишечника.

Вводить в прямую кишку – по 1 суппозиторию 2-3 раза в день.

Максимальная суточная доза – 7 суппозиториев. Длительность применения зависит от тяжести заболевания и выраженности лечебного эффекта. Обычно длительность курса лечения составляет 7-10 дней.

Побочные эффекты

Частота побочных эффектов, перечисленных ниже, не известна.

ЖКТ: сухость во рту, жажда, нарушение вкусовых ощущений, дисфагия, уменьшение моторики кишечника до атонии, уменьшение тонуса желчевыводящих путей и желчного пузыря, запор, диарея.

Со стороны почек и мочевыводящих путей: затруднение и задержка мочеиспускания.

Кардиальные расстройства: тахикардия, ощущение сердцебиения; аритмия; включая экстрасистолия; ишемия миокарда.

Сосудистые расстройства: покраснение лица, приливы.

Неврологические расстройства: головная боль, головокружение, нервозность, бессонница.

Со стороны органов зрения: расширение зрачков, фотофобия, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления, временные расстройства зрения.

Со стороны дыхательной системы и органов средостения: образование вязкой мокроты, которая тяжело откашливается.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: в том числе кожные высыпания, крапивница, эксфолиативный дерматит.

Со стороны иммунной системы: в том числе анафилактические реакции, анафилактический шок.

Другие: уменьшение потоотделения, сухость кожи, дизартрия, жжение в области заднего прохода.

В случае появления каких-либо нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Условия хранения

Хранить в защищенном от влаги и света месте, при температуре не выше 25 °С.

Не замораживать.

Срок годности

3 года

Не применять после истечения срока годности.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Упаковка

Суппозитории по 5 штук в контурной ячейковой упаковке из ПВХ/ПЭ пленки.

По 2 контурные ячейковые упаковки № 5 вместе с листком-вкладышем в картонной пачке.

Название и адрес производителя

ООО «ФАРМАПРИМ»,

ул. Кринилор, 5, с. Порумбень, р-он Криулень,

Республика Молдова, MD-4829

телефон (+373 22) 28-18-45

факс (+373 22) 28-18-46

e-mail: safety@farmaprim.md