

НД РБ

7179 - 2013

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ГЕКСИКОН®**Торговое название препарата:** Гексикон®**Международное непатентованное название:** хлоргексидин**Лекарственная форма:** суппозитории вагинальные**Состав:** Один суппозиторий содержит:

действующее вещество: хлоргексидина биглюконат - 16 мг (хлоргексидина биглюконат используют в виде полуфабриката - раствора);

вспомогательные вещества: основа для суппозитория - достаточное количество до получения суппозитория массой 3,10 г; макрогол -1500 - 92 - 98%, макрогол-400 - 8 - 2%.

Код АТС: G01AX**Фармакотерапевтическая группа**

Противомикробное и противопROTOZOЙное средство


Описание


Суппозитории белого или белого с желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается мраморность поверхности.

Фармакологические свойстваГексикон® - антисептический препарат для местного применения, активен в отношении простейших, грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Treponema pallidum*, *Chlamidia spp.*, *Ureaplasma spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Bacteroides fragilis*. К препарату слабочувствительны некоторые штаммы *Pseudomonas spp.*, *Proteus spp.*, а также устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий, грибы, вирусы. Гексикон® не нарушает функциональную активность лактобацилл. Сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) в присутствии крови, гноя.**Фармакокинетика:** при интравагинальном применении практически не всасывается, системного действия не оказывает.**Показания к применению**

Профилактика венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз); инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве-гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортom, до и после установки внутриматочной спирали (ВМС), до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями).

Копия верна

Менеджер по
регистрации - Н.Ю.Шефер



Гексикон®, суппозитории вагинальные 16 мг. Один или 5 суппозитория помещают в контурную ячейковую упаковку. Одну контурную ячейковую упаковку с одним суппозиторием и двумя напальчниками или две контурные ячейковые упаковки по 5 суппозитория вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

Срок годности

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

ОАО «НИЖФАРМ», Россия

Претензии потребителей направлять по адресу:

603950, Нижний Новгород

ГСП-459, ул. Салганская, 7

факс (831) 430-72-28

тел (831) 278-80-88

Интернет: [http:// www.nizhpharm.ru](http://www.nizhpharm.ru)

