

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Прокто-Гливенол®

Торговое название: Прокто-Гливенол®

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав

1 суппозиторий содержит

Активные вещества: трибенозид 400 мг, лидокаин 40 мг.

Вспомогательные вещества: твердый жир (витепсол E85), твердый жир (витепсол W35).

Описание

Твердые, без трещин суппозитории, торпедообразной формы, слегка жирные на ощупь. Цвет желтовато-белый. Запах слабый, специфический.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства для местного применения, используемые для лечения геморроя.

Код АТХ C05AX03.

Фармакологические свойства

Комбинированное противогеморроидальное средство. Трибенозид уменьшает проницаемость капилляров и улучшает сосудистый тонус; антагонистически воздействует на некоторые эндогенные вещества, выполняющие роль медиаторов при развитии воспаления и боли. Лидокаин оказывает местноанестезирующее действие и уменьшает выраженность симптомов (боль, жжение и зуд), вызванных геморроем.

Максимальная концентрация трибенозида в плазме крови наблюдается через 2 часа после ректального введения 1 суппозитория. Трибенозид активно метаболизируется в организме. 20-27 % введенной дозы выделяется с мочой в виде метаболитов.

Лидокаин легко абсорбируется со слизистых оболочек и плохо - с неповрежденной кожи. Его биодоступность составляет приблизительно 50 % после ректального применения. Лидокаин быстро метаболизируется в печени. Метаболиты лидокаина выделяются с мочой.

Показания к применению

Местное лечение внутренних и внешних геморроидальных узлов.


Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность (I триместр).

Способ применения и дозы

Лекарственное средство применяется только для взрослых.

Ректально. При выраженных клинических симптомах вводят по 1 суппозиторию утром и вечером. При облегчении симптомов применяют по 1 суппозиторию 1 раз в сутки.



КЛС № 014 22.05.2014

Передозировка

Случаи передозировки Прокто-Гливенолом не выявлены. В случае случайного приема внутрь рекомендуется промывание желудка и симптоматическое лечение.

Побочное действие

Редкие побочные реакции, которые могут возникнуть при применении лекарственного средства – реакции в области применения, такие как жжение (боль в месте применения), сыпь и зуд, которые могут распространяться также за пределы области применения. Кроме этих побочных реакций Прокто-Гливенол может вызвать в очень редких случаях анафилактическую реакцию, включая такие симптомы как отек Квинке и отек лица, а также бронхоспазм, сердечно-сосудистые нарушения, крапивницу.

Применение в период беременности и грудного вскармливания

В целях безопасности не следует применять Прокто-Гливенол в первом триместре беременности. Во втором и третьем триместрах беременности, а также в период кормления грудью Прокто-Гливенол может применяться только в случае острой необходимости с учетом соотношения пользы для матери и риска для ребенка. Следует рассмотреть возможность прекращения грудного вскармливания при необходимости применения препарата.

Меры предосторожности

Прокто-Гливенол следует с осторожностью применять пациентам, страдающим печеночной недостаточностью.

При первом появлении симптомов самостоятельное лечение не должно продолжаться более 2 недель. Повторные курсы лечения могут быть проведены только после консультации врача и установления диагноза.

Если имеющиеся симптомы заболевания не уменьшаются в процессе лечения, при возникновении анального кровотечения, подозрении на кровь в стуле, а также при появлении новых необычных симптомов, следует обратиться к врачу.

При применении Прокто-Гливенола необходимо следить за гигиеной анальной области, избегать чрезмерного напряжения, принимать меры для поддержания мягкой консистенции стула.

Избегать попадания лекарственного средства в глаза.

Применение у детей

Нет клинического опыта применения Прокто-Гливенола у детей.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами


Взаимодействия Прокто-Гливенола с другими лекарственными средствами не выявлены.

Влияние на способность управления транспортными средствами и работу с механизмами

Исследования по оценке влияния лекарственного средства на способность управления транспортными средствами и работу с механизмами не проводились.

Форма выпуска

По 5 суппозиториев в стрипе из комбинированного материала. 2 стрипа вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.



Прокто-Гливенол суппозитории – текст листка-вкладыша

Условия хранения

При температуре не выше 30 °С, в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

Новартис Консьюмер Хелс СА, Швейцария,

произведено Делфарм Унинж С.А.С., Франция

Адрес: 26, ру де ля Шапель, Ф-68330 Унинж, Франция

Novartis Consumer Health SA, Switzerland, produced Delpharm Huningue S.A.S, France

26, rue de la Chapelle, F-68330 Huningue, France

Представительство в России

123317, Москва, Пресненская наб.10

Тел. (495) 969 21 65, факс (495) 969-21-66

e-mail: consumerhealth@novartis.ru