


**ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ**

(информация для пациента)

**АНТИРИНОЛ**Кромогликат натрия  
Назальный спрей 2%*к 8 от 09.09.2015***Торговое название препарата:** Антиринол**Международное непатентованное название:** Кромоглициевая кислота**Лекарственная форма:** Спрей назальный 2% во флаконах 26 мл.**Описание лекарственной формы:** Бесцветный или слегка желтоватый раствор во флаконе с распылительным дозирующим устройством.**Состав:** 1 мл содержит:

активное вещество: 20 мг/мл кромогликата натрия;

неактивные вещества: бензалконий хлорид 0,1 мг, натрия эдетат 0,1 мг, вода очищенная до 1 мл.

**Фармакотерапевтическая группа:** Средства для лечения заболеваний носа. Противоаллергические средства. Код АТС: R01AC01.**Фармакологические свойства:**

Противоаллергическое средство, оказывает мембраностабилизирующее действие, блокирует поступление ионов кальция в тучные клетки, препятствует дегрануляции тучных клеток и выделению из них гистамина, брадикинина, лейкотриенов и других биологически активных веществ. Препарат наиболее эффективен в качестве средства профилактики. Предупреждает проявление аллергических реакций немедленного типа.

После ингаляции дозированного аэрозоля примерно 10% от введенной в организм дозы абсорбируется из слизистой оболочки в системный кровоток. Остальная часть препарата выводится с током воздуха или оседает на слизистых глотки, затем проглатывается и выводится из организма через пищеварительный тракт. Из пищеварительного тракта в системный кровоток всасывается 1% от введенной дозы. Кромогликат натрия не подвергается метаболическому распаду. Выводится из организма в неизменном виде с мочой и желчью приблизительно в равных количествах.

**Показания**

Профилактическое лечение аллергических ринитов.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Меры предосторожности**

Препарат Антиринол содержит в своём составе консервант бензалкония хлорид, который может вызвать локальное раздражение слизистой и бронхоспазм.

*Применение в период беременности и кормления грудью*

Кромогликат натрия может назначаться врачом только тогда, когда польза для беременной или кормящей женщины превышает возможный риск для плода или младенца.

*Влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами*

Не влияет.

**Побочные действия**

В отдельных случаях возможно проходящее легкое жжение, покраснение на месте аппликации.

**Взаимодействия с другими лекарственными средствами**

Препараты бромгексина гидрохлорида и амброксола гидрохлорида не должны ингалироваться в смеси с раствором КРОМОГЛИКАТА.

**Применение и дозировка**


Взрослым и детям рекомендуется назначать по 1 ингаляционной дозе в каждый носовой ход 4 раза/сут. При необходимости дневная доза может быть повышена максимально до 6 раз/сут. После достижения терапевтического эффекта частоту применения препарата Антиринол можно уменьшить и использовать препарат то время, пока есть контакт с аллергизирующими факторами (домашняя пыль, споры грибов, пыльца).

Для введения препарата следует снять защитный колпачок, ввести носик распылительного устройства (распылителя) в ноздрю и сильно нажать на распылительный механизм. При первом применении флакона следует несколько раз нажать на распылительный механизм до появления капелек жидкости.


**Использование спрея:**

1. Подготовьте флакон к использованию

- Удалите защитный колпачок с насадки распылителя



2. При первом применении флакона следует несколько раз нажать на распылительный механизм до появления капелек жидкости.



3. Применение спрея

- Закройте одну ноздрю пальцем
- Держите флакон вертикально
- Аккуратно вставьте носик распылителя в другую ноздрю
- Медленно вдыхая носом, распылите дозу препарата в одну половину носа.




**СОГЛАСОВАНО**  
 МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
 Принято Министерством здравоохранения  
 Республики Беларусь

Версия: V-03-GMG  
 Дата создания: 17.01.2014  
 Дата корректировки: 04.06.2015

Даты одобрения:  
 Фармакологической части: 18.02.2014  
 Согласование МЗ РБ: \_\_\_\_\_


4. Выдохните через рот.



5. Повторите распыление в другую половину носа



6. После использования спрея вытрите насадку распылителя и закройте её защитным колпачком.



**Передозировка**

До настоящего времени о случаях передозировки препарата не сообщалось.

**Срок годности и условия хранения**

3 года.

Хранить при температуре не выше 25°С, в защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечению срока годности, указанного на упаковке. После вскрытия флакона срок годности препарата – 28 дней.

**Форма выпуска:**

Флакон (26 мл) с навинчивающимся распылительным устройством в картонной коробке вместе с инструкцией по применению.

**Условия отпуска из аптек**

По рецепту.

**Производитель**

Владельцем маркетинговой авторизации является Гранд Медикал Групп АГ, Швейцария, произведено Рафарм А.О., Греция.

