



ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата
РИНЗА® ЛОРСЕПТ

Регистрационный номер:

Торговое название:
РИНЗА® ЛОРСЕПТ

МНН или ГРУППИРОВОЧНОЕ НАЗВАНИЕ:
Амилметакрезол + Дихлорбензиловый спирт&

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания (апельсиновые, лимонные, медово-лимонные)

Состав:

1 таблетка содержит:

Активные вещества:

Амилметакрезол0,6 мг

2,4-Дихлорбензиловый спирт.....1,2 мг

вспомогательные вещества: сахароза 1618,0 мг, глюкоза жидкая 856,35 мг, лимонной кислоты моногидрат 21,0 мг, аниса семян масло 2,53 мг, мяты полевой листьев масло 1,32 мг, апельсина масло 7,515 мг, краситель рибофлавина фосфат натрия 0,06 мг, краситель пунцовый (Понсо 4R) 0,05 мг (для апельсиновых таблеток); сахароза 1618,0 мг, глюкоза жидкая 856,35 мг, лимонной кислоты моногидрат 21,0 мг, аниса семян масло 2,53 мг, мяты полевой листьев масло 1,32 мг, лимона масла концентрат 7,70 мг, краситель рибофлавина фосфат натрия 0,05 мг (для лимонных таблеток); сахароза 1618,0 мг, глюкоза жидкая 856,35 мг, мяты полевой листьев масло 1,25 мг, лимона масла 1,25 мг, краситель рибофлавина фосфат натрия 0,025 мг, краситель карамель 0,625 мг, краситель пунцовый (Понсо 4R) 0,015 мг, ароматизатор медовый 7,50 мг, (для медово-лимонных таблеток).

Описание:

- апельсиновые: круглые двояковыпуклые таблетки оранжевого цвета с шероховатой поверхностью. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха и незначительная неровность краев.
- лимонные: круглые двояковыпуклые таблетки желтого цвета с шероховатой поверхностью. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха и незначительная неровность краев.
- медово-лимонные: круглые двояковыпуклые таблетки от коричневатого-желтого до коричневого цвета с шероховатой поверхностью. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха и незначительная неровность краев.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ: R02AA20

Фармакологическое действие

Препарат оказывает антисептическое действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов *in vitro*, обладает антимикотическим действием.

Показания к применению

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст (до 6 лет).

Способ применения и дозы

Местно. Взрослые и дети старше 6 лет: рассасывать по 1 таблетке каждые 2-3 часа. Максимальная суточная доза - 8 таблеток. Таблетку следует медленно рассасывать до полного растворения.

Применение при беременности и лактации

Беременным и кормящим женщинам следует посоветоваться с врачом перед применением препарата.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, диарея.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимого взаимодействия с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности

Не превышать указанные дозы.

Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата.

При назначении препарата пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что 1 таблетка содержит 0.20 хлебных единиц (ХЕ).

При сохранении симптомов обратиться к врачу.

Если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности - не выбрасывайте его в сточные воды или на улицу! Поместите лекарственное средство в пакет и положите в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду!

Влияние на способность управлять автомобилем и обслуживать движущееся механическое оборудование

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и обслуживать движущееся механическое оборудование.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания (апельсиновые, лимонные, медово-лимонные)

4 таблетки в алюминиевый стрип; 2, 3 или 4 стрипа вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

8 таблеток в блистер ал/пвх; 2 или 3 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 30 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

4 года. Не использовать после истечения срока годности.

Отпуск из аптек: без рецепта.

Организация, принимающая претензии

ООО «Джонсон & Джонсон», Россия

121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 2,

тел. (495) 726-55-55

Производитель

«Юник Фармасьютикал Лабораториз» (Отделение фирмы «Дж. Б. Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд.»), Ворли, Мумбай - 400 030, Индия /

Unique Pharmaceutical Laboratories (A Division of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd), Worli, Mumbai 400 030, India

Адрес производственной площадки

Участок № 101/2 или 102/1, Даман Индастриал Истейт,

Кадайя, Даман: 396 210. Индия /

Survey №.101/2 & 102/1, Daman Industrial Estate,

Kadaiya, Daman: 396 210. India.

Представитель фирмы



Е.П. Давыдова