


**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
(информация для пациентов)**



Лекарственная форма: драже.

Описание

Драже округлой формы, с гладкой, однородной поверхностью; от желтого до желтовато-оранжевого цвета; с характерным ароматным запахом и сладко-кислым вкусом.

Состав для одного драже:

Витамина А в виде

Ретинола пальмитата - 1,38 мг (2500 МЕ)

Тиамина гидрохлорида - 1,0 мг

Рибофлавина - 1,0 мг

Аскорбиновой кислоты - 35,0 мг

Вспомогательных веществ: сахар, патока крахмальная, тальк, парафин, масло вазелиновое, масло апельсиновое, тартразин (Е 102).

Фармакотерапевтическая группа: Поливитамины.

Код АТХ: А11ВА

Фармакологические свойства

Поливитаминовый препарат общеукрепляющего действия. Витамины А, В₁, В₂ и С принимают участие в построение ферментных систем и активно влияют на разные процессы в организме.

Ретинола пальмитат или ацетат (Витамин А) оказывает важную роль в зрительной функции глаз, предотвращает задержку роста и необходим для поддержания и восстановления эпителиальных тканей, ингибирует процессы кератинизации.

Тиамин (Витамин В₁) обеспечивает нормальную деятельность нервной системы, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Рибофлавин (Витамин В₂) в организме превращается в коферменты флавинопротеинов, необходимые для транспортировки водорода и регулирования окислительно-восстановительных процессов, а так же участвует в синтезе АТФ в митохондриях; участвует во множестве реакций метаболизма белков, углеводов и жиров, поддерживает нормальную зрительную функцию глаза и играет важную роль в синтезе гемоглобина.

Аскорбиновая кислота (Витамин С) участвует в окислительно-восстановительные процессы, в метаболизме углеводов, регулирует свертываемость крови, регенерацию тканей, повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям, стимулирует биохимическую активность витаминов группы В.



Показания к применению

Профилактика и лечение гиповитаминозов состояния, сопровождающиеся повышением потребности в витаминах (повышенная физическая или нервно-психическая нагрузка, неблагоприятные условия окружающей среды, беременность, кормление грудью, несбалансированное питание, прием оральных контрацептивов, период выздоровления, после перенесенных заболеваний, травм и ожогов).

Для повышения сопротивляемости организма к инфекционным и простудным заболеваниям в период неблагоприятной эпидемической обстановки.

Противопоказания

Гиперчувствительность, нефролитиаз, непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы, гипервитаминоз А, хронический гломерулонефрит, саркоидоз в анамнезе, нарушение обмена железа или меди, детям до 6 лет.

Меры предосторожности

Аскорбиновая кислота, как восстановитель, может искажать результаты различных диагностических тестов (содержание в крови глюкозы, билирубина, этинилэстрадиола, активности трансаминаз, ЛДГ), может скрыть наличие крови в стуле.

Сообщите лечащему врачу о том, какие препараты Вы принимаете, в том числе ацетилсалициловую кислоту, травы или другие витамины.

Спиртосодержащих лекарственных препаратов для приема внутрь (н-р настойку женьшеня, элеутерококка) необходимо принимать за три часа до или после приема препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Всасывание витаминов, входящих в состав препарата, уменьшается при одновременном применении слабительных средств минерального происхождения, оральных контрацептивов, употреблении свежих фруктовых или овощных соков, щелочного питья. Сульфаниламиды, никотиновая кислота и спиртосодержащие препараты также нарушают нормальное всасывание витаминов.

Антибиотики, лекарства, содержащие серу, оральные контрацептивы, антацидные препараты могут снижать уровень витаминов в организме.

Совместим с противоанемическими средствами (способствуют абсорбции препаратов железа), антигипоксантами, анаболиками. Предупреждает или уменьшает нежелательные эффекты хлорамфеникола (нарушение гемопоза, неврит зрительного нерва).

При одновременном применении с ацетилсалициловой кислотой, барбитуратами или с примидоном происходит повышение экскреции с мочой аскорбиновой кислоты.

Входящая в состав препарата аскорбиновая кислота может повышать всасывание пенициллина, железа, уменьшать действие гепарина и непрямых антикоагулянтов, увеличивать риск кристаллурии при лечении салицилатами.

СОГЛАСОВАНО

Министерством здравоохранения
Республики Беларусь
Министерством здравоохранения
Республики Беларусь**Особенности применения**

С осторожностью применять при тромбофлебитах, склонности к тромбозам и сахарном диабете, у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, гипероксалурией, прогрессирующим онкологическим заболеванием, нарушениями функции почек, указаниями в анамнезе на мочекаменную болезнь. Препарат может окрашивать мочу в желтый цвет.

Наличие в составе препарата витамина А должно учитываться при совместном применении с другими лекарственными средствами, содержащими этот витамин.

Больные сахарным диабетом должны учитывать, что каждое драже содержит 0,439 г сахара и откорректировать дозы гипогликемических лекарственных средств.

Применение в период беременности и кормления грудью

Применение в период беременности и кормления грудью возможно только с профилактической целью после консультации врача со строгим соблюдением рекомендуемых доз. Для устранения витаминной недостаточности у беременных женщин и матерей, кормящих грудью, следует отдавать предпочтение специализированным комплексам витаминов с минеральными веществами.

Влияние на способность управлять автотранспортом или другими механизмами

Препарат не оказывает влияния на скорость реакции водителей транспортных средств и лиц, обслуживающих установки, требующие особого внимания.

Способ применения и дозировка

Внутрь, через 10-15 минут после еды.

Взрослым с профилактической целью назначают по 1 драже 2 раза в день, с лечебной целью по 2 драже 3 раза в день.

Детям с целью профилактики препарат назначают с 11 лет по 1 драже в день. С лечебной целью детям от 6 до 10 лет - по 1 драже 2 раза в день, от 11 до 14 лет - по 1 драже 3 раза в день.

Максимальная суточная доза 6 драже.

Продолжительность курса лечения зависит от характера заболевания и может составлять 1 - 2 месяца.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, диарея, повышение возбудимости ЦНС, бессонница.

При подозрении на передозировку обратитесь к лечащему врачу. В зависимости от тяжести состояния, врач примет решение о соответствующих мерах лечения.

Лечение: симптоматическое.

Побочное действие

Рекомендуемые дозы обычно хорошо переносятся. Однако, очень редко возможны побочные реакции:

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

Со стороны иммунной системы: у лиц с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции, включая анафилактический шок, ангионевротический отек, гипертермия, редко – бронхоспазм у лиц с гиперчувствительностью к витаминам А, С, витаминов группы В и др..

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, крапивница, зуд, покраснение кожи.

ЖКТ: диспепсические расстройства, тошнота, рвота, диарея. Для предупреждения подобных нежелательных явлений рекомендуется принимать препарат после еды.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, повышенная возбудимость, сонливость, потливость.

Прочие: нарушение зрения, возможно окрашивание мочи в желтый цвет.

При длительном применении в высоких дозах возникают раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, аритмии, парестезии, гиперурикемия, снижение толерантности к глюкозе, гипергликемия, нарушение функции почек, сухость и трещины на ладонях и ступнях, выпадение волос, себорейная сыпь.

При появлении вышеуказанных побочных реакций, а также при появлении других побочных реакций, не упомянутых в инструкции, необходимо прекратить прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

Условия хранения и срок годности

В защищенном от влаги и света месте, при температуре 15 °С - 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 1 год и 6 месяцев.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска: без рецепта врача.

Упаковка: по 80 драже в полимерных контейнерах белого цвета. Каждый контейнер вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Фирма-производитель

ООО «ДЕПОФАРМ»

Республика Молдова, МД-6501, г. Анений Ной, пер. Артезианский, 13

Тел./Факс: +(373 265) 2-60-57

Представитель ООО «ДЕПОФАРМ» в Республике Беларусь

Фармацевт Мариана Стати

Республика Молдова, МД-6501, г. Анений Ной, пер. Артезианский, 13

Тел.: +(373 265) 2-58-74

depofarm@mail.ru

Предъявляйте любые жалобы и пожелания вместе с номером серии, указанной на упаковке.