

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению
(листок-вкладыш)

«Бальзам «Золотая звезда» жидкий бальзам 5мл

Название лекарственного препарата:

«Бальзам «Золотая звезда»

Лекарственная форма:

жидкий бальзам 5мл

Описание:

Прозрачная маслянистая жидкость коричневато- красного цвета со специфическим для эфирных масел запахом.

Состав на 1мл:

Действующие в-ва:

Ментол кристаллический (L-ментол) – 280мг

Камфора рацемическая – 88,8мг

Мяты перечной масло – 229мг

Эвкалиптовое масло – 1,0мг

Гвоздичное масло – 4,6мг

Коричное масло – 3,8мг

Вспомогательные в-ва:

Жидкий парафин – до 1мл.

Код ATX:

R 05X

Фармакотерапевтическая группа:

Прочие лекарственные средства, применяемые для лечения простудных заболеваний.

Фармакологические свойства:

Препарат обладает местно-раздражающим, отвлекающим и антисептическим действием.

Показания для применения:

Применяют в качестве симптоматического средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, в качестве отвлекающего средства при головной боли.

Способ применения и дозировка:

Препарат применяется наружно, наносят тонким слоем и слегка втирают (при головной боли - на область виска или затылка; при гриппе и простудных заболеваниях - на область груди и спины).


При нанесении препарата следует избегать травмирующих кожу движений. Область нанесения препарата можно прикрыть чистой сухой тканью (ткань рекомендуется прикладывать неплотно).

Только для наружного применения! Не принимать внутрь!

Не наносить на кожу лица в области носа, учитывая возможность развития рефлекторного бронхоспазма.

Не наносить препарат на большие участки кожи.

Применять препарат до 3-х раз в сутки. Продолжительность лечения определяется индивидуально в зависимости от переносимости препарата и эффективности лечения.



Применение у детей:

В связи с отсутствием достаточных данных применение лекарственного средства у детей и подростков до 18 лет противопоказано.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Побочное действие:

Возможны бронхоспастические реакции, контактный дерматит, зуд, головная боль, головокружение, возможно развитие судорог вызванных камфорой, аллергические реакции, при появлении которых применение препарата должно быть прекращено. Остатки бальзама необходимо смыть с кожи тёплой водой с мылом.

У детей при нанесении на область носа возможно развитие рефлекторного бронхоспазма и рефлекторного угнетения дыхания.

При появлении побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение бальзама и обратиться к врачу.

Противопоказания:

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, коклюш, склонность к бронхоспазму, бронхиальная астма, эпилепсия, судороги в анамнезе (в том числе фебрильные). Заболевания или нарушение целостности кожных покровов в месте предполагаемого нанесения препарата. Препарат не следует применять детям до 18 лет.

Применение препарата во время беременности и лактации.

В связи с отсутствием клинических данных применение лекарственного средства беременными и кормящими женщинами не рекомендовано.

Особые указания:

Обработка больших поверхностей тела запрещается. Лекарственный препарат можно применять только на чистой коже неповреждённой кожи. При нанесении препарата на кожу не должна возникать боль. В случае возникновения боли, отёка или высыпаний на коже, необходимо прекратить применение препарата и немедленно обратиться к врачу.

После нанесения лекарственного препарата не рекомендуется применять местное тепло (грелки, лампы, пакеты или бутылки с горячей водой) в связи с увеличением риска возникновения кожных реакций. Пациентам с повышенной чувствительностью не следует применять горячий душ или ванну до и после применения препарата. Из-за опасности фотосенсибилизации избегать пребывания на солнце.

Следует избегать попадания бальзама в глаза, на слизистые оболочки носа и полости рта, а также на повреждённые участки кожи. Если после применения лекарственного средства эффект отсутствует или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Передозировка:

В связи с содержанием камфоры, в случае приёма бальзама внутрь в количестве 5мл и более, необходимо немедленно обратиться к врачу.

При случайном приёме бальзама внутрь симптомы передозировки включают желудочно-кишечные (тошнота, рвота, диарея, боли в животе) и неврологические расстройства (головная боль, головокружение, ощущения жара/приливы, судороги, угнетение дыхания и кома).

Лечение симптоматическое. При передозировке не следует вызывать рвоту из-за рисков, связанных с последующей ингаляцией камфоры и развитием ларингоспазма у детей младшего возраста, который может привести к летальному исходу.

Передозировка при наружном применении проявляется ощущением сильного тепла и жжения. При возникновении симптомов передозировки необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Исследования по оценке взаимодействия с другими лекарственными средствами не проводились.

Не рекомендовано применять одновременно с другими средствами для наружного применения (кремы, мази).

БД РБ


6132 - 2013

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работу со сложными механизмами:

Исследования не проводились.

Условия и срок хранения:

В сухом защищённом от света месте при температуре не выше 30°C
Хранить в недоступном для детей месте.



Срок годности:

5 лет. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска:

Без рецепта врача.

Упаковка:

Флакон прозрачного стекла 5мл с навинчивающимся пластиковым колпачком вместе с инструкцией по применению помещен в картонную пачку.

Производитель:

DANAPHA PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY,
№253, ул. Зунг Си Тхань Хе, р-он Тхань Хе, г. Да Нанг, Вьетнам

Организация принимающая претензии потребителей:

DANAPHA PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY,
№253, ул. Зунг Си Тхань Хе, р-он Тхань Хе, г. Да Нанг, Вьетнам