

6561 - 2018

Листок-вкладыш – информация для потребителя

Септолете® Лимон
 таблетки для рассасывания покрытые оболочкой
 Цетилпиридиния хлорид

СОГЛАСОВАНО
 МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 Приказ Министерства здравоохранения
 Республики Беларусь
 № 522
 от 24.05.2018 № 522

Антисептик для полости рта и горла

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается, или оно ухудшается, через 3 дня вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Септолете® Лимон, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата Септолете® Лимон
3. Прием препарата Септолете® Лимон
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Септолете® Лимон
6. Содержимое упаковки и прочие сведения


1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ СЕПТОЛЕТЕ® ЛИМОН И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Таблетки для рассасывания покрытые оболочкой Септолете® Лимон обладают местным противомикробным действием. Препарата содержит цетилпиридиния хлорид – антисептик из группы четвертичных аммониевых соединений, действующий как катионактивный детергент. Он активен в отношении грамположительных бактерий, обладает меньшей активностью в отношении грамотрицательных бактерий. Цетилпиридиния хлорид также обладает противогрибковым и противовирусным действием.

Септолете® Лимон дезинфицирует полость рта и горло, тем самым, облегчая боль и чувство дискомфорта, связанные с воспалительным процессом, а также предотвращает развитие более тяжелого бактериального воспаления. Благодаря хорошим смачивающим свойствам и низкому поверхностному натяжению цетилпиридиния хлорид проникает в труднодоступные места, складки и карманы слизистой оболочки, и останавливает рост бактерий.

Таблетки для рассасывания покрытые оболочкой Септолете® Лимон имеют приятный и освежающий вкус лимона.


Препарат推薦ован для местного лечения в составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (стоматит, тонзиллит, фарингит).



2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА СЕПТОЛЕТЕ® ЛИМОН

Не принимайте Септолете® Лимон

- если у вас аллергия на цетилпиридиния хлорид или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша),
- если у вас бронхиальная астма или другие респираторные состояния, связанные с тяжелой гиперчувствительностью дыхательных путей,
- в области открытых ран полости рта,
- при наличии в анамнезе у ребенка судорог (в том числе, фебрильных),
- дети до 6 лет.



Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата в следующих случаях проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

- Таблетки для рассасывания не рекомендованы детям младше 6 лет.
 - Препарат не следует принимать при наличии открытых ран в полости рта (например, после удаления зуба или операции по удалению миндалин), поскольку цетилпиридиния хлорид замедляет заживление ран.
 - В случае тяжелой инфекции, сопровождающейся высокой температурой, головной болью и рвотой, следует обратиться к врачу, особенно если состояние не улучшается в течение 3 дней.
 - Пациентам с сахарным диабетом следует иметь в виду, что в каждой таблетке содержится около 1 г малютита. Из-за медленного гидролиза и плохого всасывания в желудочно-кишечном тракте малютит оказывает клинически незначительный эффект на повышение уровня сахара в крови.
 - Пациентам с хроническим кашлем или охриплостью следует проконсультироваться с врачом.
 - Пациентам с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей в стадии обострения или грыжей пищеводного отверстия диафрагмы следует применять с осторожностью.
- Вам следует обратиться к врачу также и в том случае, если данные заявления имели место в любой момент в прошлом.

Не следует превышать рекомендованные дозы.

Другие препараты и препарат Септолете® Лимон

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Не описано случаев взаимодействия Септолете® Лимон с другими препаратами.

Использование анионных ПАВ (например, в зубной пасте) снижает эффективность цетилпиридиния хлорида.

Септолете® Лимон с пищей и напитками

Не запивайте Септолете® Лимон молоком, так как возможно снижение антимикробной активности препарата.

Не принимайте Септолете® Лимон непосредственно перед едой или во время приема пищи. Не следует есть или пить в течение как минимум одного часа после приема препарата.



НД РБ

6561 - 2018

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что беременны, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Так как данные по безопасности применения во время беременности и в период грудного вскармливания ограничены, то указанной категории пациентов принимать препарат не рекомендуется.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Септолете® Лимон не оказывает влияния на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

Септолете® Лимон содержит жидкий мальтит, мальтит (E965), натрия бензоат (E211)

Септолете® Лимон содержит натуральные красители; окраска таблеток со временем может меняться / тускнеть, особенно при воздействии света, что никак не влияет на эффективность препарата.

При наличии непереносимости некоторых сахаров, перед началом приема препарата следует проконсультироваться с врачом.

Натрия бензоат (E211) в незначительной степени может вызывать раздражение кожи, глаз и слизистых оболочек.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СЕПТОЛЕТЕ® ЛИМОН

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Дети от 6 до 12 лет

Следует рассасывать во рту по 1 таблетке каждые 4 часа.

Рекомендуемая доза: до 4 таблеток в день.

Дети старше 12 лет и взрослые

Следует рассасывать во рту по 1 таблетке каждые 2 часа.

Рекомендуемая доза: до 8 таблеток в день.

Септолете® Лимон не рекомендован детям младше 6 лет.

Не принимайте Септолете® Лимон непосредственно перед едой или во время приема пищи. Не следует есть или пить в течение как минимум одного часа после приема препарата.

Если вам кажется, что препарат оказывает слишком слабое или слишком сильное действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Если вы приняли препарата больше, чем следовало

При приеме доз, превышающих рекомендуемые, следует немедленно обратиться к лечащему врачу или работнику аптеки.

Учитывая концентрацию действующего вещества в каждой таблетке, несогласование с лечащим врачом маловероятна.

Для документов

При приеме больших доз возможны нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея. В таком случае следует прекратить прием препарата, выпить большое количество воды или молока и обратиться к лечащему врачу.

Если вы забыли принять препарат

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

При наличии вопросов по применению препарата обратить к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным средствам этот препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Редкое ($\geq 1/10\ 000$ до $< 1/1\ 000$):

- нарушения функции желудочно-кишечного тракта, в частности, у пациентов с повышенной чувствительностью и при превышении рекомендованных доз.

Очень редкие (< 1/10 000):

- реакции гиперчувствительности.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СЕПТОЛЕТЕ® ЛИМОН

Хранить в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Латой истечения срока годности является последний день месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Хранить в оригинальной упаковке с целью защиты от света и влаги.

Не выбрасывайте препарат в водопровод или канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не требуются. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Септолете® Лимон содержит

стеарат, титана диоксид (Е171), повидон К 25, Капол 600 Фарма (воск пчелиный белый, карнаубский воск, шеллак).


Внешний вид препарата Септолете® Лимон и содержимое упаковки

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой желтого цвета. Допускается наличие темных вкраплений.

Упаковка: 18 таблеток для рассасывания покрытых оболочкой в блистерах из ПВХ / ПВДХ пленки и алюминиевой фольги (2 блистера по 9 таблеток для рассасывания покрытых оболочкой) в картонной коробке с листком-вкладышем.

Условия отпуска

Без рецепта врача.



Держатель регистрационного удостоверения и производитель
КРКА, д. д., Ново место, Шмарешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения.

